



Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna háziorvos- és sportszakorvos
homeopátiás és gyógynövényterápiás orvos

Dr. Cs. Szabó Med Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
6800 Hódmezővásárhely, Agyag u. 11.
Tel.: 62/238-596 E-mail: cs.szabozsu@invitel.hu www.homeopatia.cwi.hu

Gyógyhatású készítmények ismertetése betűrendben

*Az alábbi összeállítást Csamangó István bocsátotta rendelkezésemre.
(Csi-Stúdió, Szeged, Szepesi u. 6/B)
Köszönet érte.*

Agiolax granulátum

Összetétel

Plantago-ovata magja és maghéja, szennatermés, köménymagolaj, orvosi zsályaolaj, borsosmentaolaj.

Felhasználási javaslat

Székrekedés megszüntetésére, a székletürítés megkönnyítésére szolgál (pl. tartós ágyban fekvésnél, aranyér vagy végbélbepedés esetén, sebészeti beavatkozás után).

Alkalmazás

Felnőtteknek 1 teáskanálnyi ajánlott (5 g) este, étkezés után. Szükség esetén reggel ismét 1 teáskanálnyi étkezés előtt. A készítményt szétrágás nélkül, bő folyadékkal kell bevenni. Makacs székrekedés esetén 6 óránként adható 1-1 teáskanálnyi granulátum 1-3 napig. Gyermekeknek a szokásos adag 6-12 éves korig naponta 1 teáskanálnyi este, étkezés után. 12 éves kor feletti gyermekek kezelése a felnőttek adagjával történhet.

Figyelmeztetés

A készítmény tartósan nem alkalmazható. Amennyiben a kezelés 1-2 hét alatt nem hozza meg a kívánt eredményt, a kezelőorvoshoz kell fordulni. Ugyancsak a kezelőorvos tanácsát kell kérni terhesség és szoptatás esetén! A gyomor-béltraktusban lévő szűkület, bélelzáródás vagy annak gyanúja, továbbá nehezen beállítható cukorbetegség esetén alkalmazása ellenjavallt!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

Madaus AG. D-51109 Köln, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-478/1996.

Aknesol ecsetelő

Összetétel

Benzoé és meténamin tartalmú alkoholos folyadék.

Felhasználási javaslat

A bőr faggyúmirigyeinek fokozott működésén és a bőrfaggyú összetételének megváltozásán alapuló kórfolyamatok esetében. Főként pattanások ellen alkalmazható jó eredménnyel. A kezelés során a gennyes és fájdalmas pattanások kisebbek lesznek, illetve eltűnnek. Csökken a miteszer képződés és a fájdalom.

Alkalmazás

A beteg bőrfelületet meleg vízzel tisztítsuk meg, és kezdetben naponta 2-szer, majd 1-szer, javulás után hetente 2-3 alkalommal ecseteljük Aknesollal átitatott pálcikára tekert vattával.

Figyelmeztetés

Ha a kezelés kezdetén bőrpír, viszketés, kiütés lép fel, a kezelést abba kell hagyni!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 60 ml.

Gyártja

Komárom-Esztergom Megyei Gyógyszertári Központ, 2892 Tata, Pf. 201.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-133/1989.

Alkymer kapszula**Összetétel**

Standardizált összetételű (20% alkilglicerol) cápamáj olaj (A- és D-vitamint nem tartalmaz).

Felhasználási javaslat

A készítmény grönlandi és más cápafajokból kivont, alkilglicerolokban gazdag olajat tartalmaz. Az alkilglicerolok az emberi szervezetben is előfordulnak, így megtalálhatók az anyatejben, a csontvelőben, a májban, a lépben és a vörösvértestekben. Az alkilglicerolok nélkülözhetetlenek a fehérvérsejtek képzésében. A készítmény ezért a szervezet védekezőképességének fokozására, az általános gyengeségérzet megszüntetésére és a sebgyógyulás elősegítésére alkalmas.

Alkalmazás

Naponta 2-3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 60 kapszula.

Gyártja

EXPOSÁN AB, Svédország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-570/1995.

Allice® kapszula**Összetétel**

500 mg adalékanyag mentes, biológiailag értékes vöröshagyma-szójaolaj 1:1 arányú keveréke.

Felhasználási javaslat

Gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatása révén csökkenti a légúti megbetegedések kialakulásának veszélyét (szénanátha, baktériumok okozta fertőzések stb.).

Alkalmazás

Naponta 3x 1 kapszula.

Figyelmeztetés

Légúti betegségnél a nehézlégzés oldására nem alkalmas! Ritkán enyhe emésztési zavart okozhat, mely a dózis csökkentésével kiküszöbölhető.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 30 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-516/1995.

Allidex filmtabletta**Összetétel**

Természetes fokhagymaolaj-B ciklodextrin zárvány komplexben.

Felhasználási javaslat

Eredményesen alkalmazható az érlemeszesedés kialakulásának megelőzésére (lassítja a folyamat előrehaladását). A fokhagymaolaj csökkenti a szérumkoleszterin- és trigliceridszintet, mérsékli a vér fokozott alvadékonyságát, enyhén vérnyomáscsökkentő hatású.

Alkalmazás

Naponta 2-3 alkalommal 1 tablettát ajánlott étkezés előtt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 20 draszté.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-615/1996.

Allithera kapszula**Összetétel**

Ligetszépeolaj és fokhagymaolaj.

Felhasználási javaslat

Kedvezően befolyásolja a magas vérnyomást, lassítja a szervezet érlemeszesedési és öregedési folyamatait, mérsékli a menstruációt megelőző kellemetlen tüneteket, fokozza a szervezet természetes ellenálló képességét, csökkenti az alkohol elvonási tüneteket.

Alkalmazás

Kezdetben naponta 3x2, majd 3xl kapszula bevétele javasolt.

Figyelmeztetés

Ideggyógyászati vagy pszichiátriai kezelés esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 100 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-161/1991.

Aminoerg® regeneráló oldat és gél

Összetétel

Esszenciális aminosavak és gyógynövénykivonatok.

Felhasználási javaslat

Az oldat izomsérülés, zúzódás, ficam, isiász, lumbágó, gipszlevétel utáni kezelések esetén alkalmazható. A gél szintén bármely felsorolt esetben használható, kényelmes alkalmazási lehetőségeket kínál.

Alkalmazás

Naponta 2-5 alkalommal végezzünk vele borogatást. Ínhüvelygyulladás, reumatikus végtagfájdalmak esetén naponta több alkalommal dörzsöljük a bőrbe a fájó testfelületen.

Figyelmeztetés

Nyílt sérülésekre, sebre a készítmények nem alkalmazhatók!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység:

Oldat: 250 ml, 500 ml.

Gél: 75 g, 100 g.

Gyártja és Forgalmazza

MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b

Kapható

Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék Nagykereskedésben. 1077 Budapest, Rózsa utca 47.

Nyilvántartási szám: OGYI-506/1995, OGYI-328/1992.

Andrews gyógsó

Összetétel

Nátrium-bikarbonát, citromsav, keserűs, szacharóz.

Felhasználási javaslat

Nehéz ételek okozta, illetve túlzott ételfogyasztás után jelentkező panaszok enyhítésére alkalmas. Helyileg fejt ki hatást a gyomor-bél traktusra. A savlekötő hatású nátrium-bikarbonát a citromsavval együtt egyensúlyt teremt a gyomor sav-bázis viszonyában. A vízben pezsegve feloldódó, kellemes ízű por a gyomorürítést is serkenti. Megszünteti a túlzott ételfogyasztás után jelentkező emésztési zavart, epebántalmat.

Alkalmazás

Oldjunk fel 1 csapott kávéskanálnyi vagy 1 tasaknyi port 1 pohár (1-2 dl) vízben, és míg pezseg, igyuk meg, étkezés után vagy lefekvéskor. Kétszeres adagja - 2 kávéskanálnyi vagy 2 tasak por -, mivel a készítményben keserűs van, enyhe hashajtóként hat. Gyermekeknek (6-12 éves korban) a felnőtt adagok fele adható.

Figyelmeztetés

A tetraciklinek felszívódását gátolja!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerezési egység: 113 g, 227 g vagy 4x5 gramm/tasak.

Gyártja és Forgalmazza

SmithKline Beecham Kft. 1023 Budapest, Frankel Leó utca 30-34.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-252/1991.

Antipoll csepp

Összetétel

Angyalgyökér, borókabogyó, citromfű, galagonya termése és virágos ágvége, majoránna, orvosi pemetefű, ökörfarkkóró-virág, örvénygyökér és vasfű alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

Az Antipoll előnyösen alkalmazható allergiás eredetű felső légúti, megbetegedésekben (pl. pollenózis, szénanátha) és hűléses eredetű hurutos állapotban a tünetek mérséklésére vagy enyhébb esetben, megszüntetésére. Köptető, gyulladáscsökkentő, nyugtató hatású összetevői kedvezően egészítik ki egymást. A készítmény mellékhatásoktól mentes nyugtatja a légutak nyálkahártyáját, segíti a légúti váladék fellazítását, felköhögését.

Alkalmazás

Szedését a virágpor, illetve a szálló termések várható megjelenése előtt javasolt megkezdeni. Az első héten naponta 1x4 ml, a második héten naponta 2x4 ml, a kezelés harmadik hetében naponta 3x4 ml bevételre ajánlott 1 dl ivóvízben elkeverve.

Figyelmeztetés

A készítmény 36% alkoholt tartalmaz! Gyermekeknek 10 éves kor alatt nem ajánlott a fogyasztása! Gépjárművezetőknek, magasban dolgozóknak, alkoholelvonó kúra alatt állóknak és alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszereket szedőknek alkalmazása ellenjavallt!

Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig.

Kiszerezési egység: 100 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Arany Kapu Rt. 6413 Kunfehértó Pf. 5.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-533/1995.

Apisarthron méhméregkenőcs**Összetétel**

Méhméreg, metilszalicilát, allil-izotiocianát.

Felhasználási javaslat

Alkalmazása az izmok és az ízületek reumás eredetű megbetegedéseiben, az izmok, inak és ínszalagok funkcionális zavaraiiban, sporttevékenység előtti és utáni bemelegítéskor ajánlott. Hatása azon alapszik, hogy a méhméreg tágítja a hajszálereket, és az így megnövekedett véráramlás javítja a szövetek oxigénellátását, elősegíti a fájdalmat kiváltó anyagcsere-termékek lebontását.

Alkalmazás

A kezelendő felületet kb. 1 mm vastagon kenjük be, majd a bőrpír megjelenéséig lassan, erőteljesen dörzsöljük bele a szert a bőrbe. A kezelt felületet tartjuk melegen. Naponta 2-3 alkalommal ismételjük meg a kezelést.

Figyelmeztetés

Méhméreg-allergia, bőrbetegségek, heveny gyulladások, továbbá veseelégtelenség esetén, nagy testfelületen történő alkalmazása nem javasolt! Szembe, nyálkahártyára és nyílt sebre ne kerüljön! Túlérzékeny egyénekben a kenőcs esetenként fokozott bőrreakciót válthat ki.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 30 g

Gyártja

ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH. Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-384/1993.

Balneum hermal fürdőolaj**Összetétel**

Szójaolaj, polidocanol.

Felhasználási javaslat

Mindenkinek ajánlható, akinek száraz a bőre, az ehhez társuló viszketés kezelésére. Így például csecsemők, kisgyermek és időskorúak érzékeny bőrének ápolására, csecsemőkori seborrhoea, pelenka alatti bőrgyulladás, toxikus-degeneratív és allergiás ekcéma, végtagokon jelentkező ekcéma, öregkori viszketés (pruritus senilis), neuroderma, pikkelysömör (psoriasis), halpikkelybőrűség (ichtyosis) kiegészítő kezelésére.

Alkalmazás

A tünetektől függően, egyéni elbírálás szerint állapítható meg a szükséges fürdőolaj-tartalom, a fürdő időtartama és gyakorisága. Egyaránt felhasználható teljes és részleges fürdő készítéséhez és zuhanyozásra (a bőrt fürdőolajjal bekenve, majd lemosva).

Figyelmeztetés

Propilénlikollal szembeni túlérzékenység és a psoriasis pustulosa friss eseteiben ellenjavallt! Nagy felületű bőrsérülések, láz, fertőzőes megbetegedés, szívelégtelenség, magas vérnyomás fennálltakor csak a kezelőorvossal történt megbeszélés után alkalmazható! Az alkalmazás során bőrvörösség, viszketés, égő érzés, ritkán szőrtüszőgyulladás léphet fel. Ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. A szappanok hatását csökkentik.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

Gyártja

Hermal Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország.

Importálja és Forgalmazza

MERCK Kft. 1116 Budapest, Talpas utca 3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-297/1992.

Balneum hermal F fürdőolaj

Összetétel

Földimogyoró és paraffinolaj.

Felhasználási javaslat

A Balneum Hermal F fürdőolaj felhasználási területe lényegében megegyezik a Balneum Hermal fürdőolajével, jelentősebb azonban a zsírpótló hatása.

Alkalmazás

A tünetektől függően, egyéni elbírálás szerint állapítható meg a szükséges fürdőolaj-tartalom, a fürdő időtartama és gyakorisága. Egyaránt felhasználható teljes és részleges fürdő készítéséhez és zuhanyozásra (a bőrt fürdőolajjal bekenve, majd lemosva).

Figyelmeztetés

Propilénlikollal szembeni túlérzékenység és a psoriasis pustulosa friss eseteiben ellenjavallt! Nagy felületű bőrsérülések, láz, fertőzőes megbetegedés, szívelégtelenség, magas vérnyomás fennálltakor csak a kezelőorvossal történt megbeszélés után alkalmazható! Az alkalmazás során bőrvörösség, viszketés, égő érzés, ritkán szőrtüszőgyulladás léphet fel. Ilyenkor a kezelést abba kell hagyni. A szappanok hatását csökkentik.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

Gyártja

Hermal Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország.

Importálja és Forgalmazza: MERCK Kft. 1116 Budapest; Talpas utca 3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-299/1992.

Balneum hermal plus fürdőolaj

Összetétel

A Balneum Hermal fürdőolajéhoz hasonló, de több polidocanol tartalmaz.

Felhasználási javaslat

A Balneum Hermal fürdőolajhoz hasonlóan a száraz, hámló, viszkető és érzékeny bőr kezelésére, a veleszületett allergiás túlérzékenység, pikkelysömör (psoriasis), halpikkelybőrűség (ichtyosis) kezelésének kiegészítésére alkalmazható. A Plus változatnak fokozott a viszketéscsillapító hatása. Egyéb tekintetben megegyezik a Balneum Hermal fürdőolajjal.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 200 ml, 500 ml, 1000 ml.

Gyártja

Hermal Kurt Herrmann, Scholtzstrasse 3., D-2057 Reinbek b. Hamburg, Németország.

Importálja és Forgalmazza

MECK Kft. 1116 Budapest, Talpas utca 3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-298/1992.

Bano svédkeserű

Összetétel

16 féle gyógynövény alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

Emésztési és gyomorpanaszok esetén alkalmazható, serkenti az emésztőmirigyek működését, fokozza az emésztőnedvek (gyomorsav, epe stb.) elválasztását. Enyhe hashajtó hatása révén megszünteti a bélrenyheséget, elősegíti a szervezet salaktalanítását. Étvágyjavító, így legyengült állapotban roborálásra alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 2 alkalommal 1 kávéskanálnyi bevétele javasolt (lehetőleg reggel és este), kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés

Alkoholtartalma miatt májbetegek, alkoholbetegek ne fogyasszák! Terhesség és szoptatás idején, bélelzáródás esetén ellenjavallt! 35% alkoholt tartalmaz. Olyan gyógyszerekkel együtt, amelyek hatását az alkohol befolyásolja, alkalmazása kerülendő.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 500 ml.

Gyártja

Mag. Josef Bano Chem.-pharm Präparate, A-6580 St. Anton, Ausztria.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-292/1992.

Ben-Gay kenőcs**Ben-Gay sportbalzsam****Összetétel**

Metilszalicilát, mentol.

Felhasználási javaslat

A kenőcs jól alkalmazható enyhe ízületi gyulladáshoz társuló izommerevség és hátfájdalom gyors és hatékony kezelésére. A sportbalzsam jól használható várhatóan nagyobb sportteljesítmények vagy edzés előtt az általános komfortérzés és a teljesítmény javítása céljából, valamint fizikai terhelést követően a túlterhelt izomzat fájdalmainak csökkentésére.

Alkalmazás

A készítményt naponta 3-4 alkalommal masszírozzuk be a fájó területeken a bőrbe.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 35 g.

Gyártja

Pfizer Ilaclari A.S. Ortaköy-Istanbul 80840.

Forgalmazza

Pfizer Biogal Kft. 1149 Budapest, Tábornok utca 2.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-461/1994, OGYI-462/1994.

Bérescsepp plussz**Összetétel**

Vas, cink, nátrium, magnézium, mangán, kálium, réz, molibdén, vanádium, nikkel, bór, fluor, kobalt szerves hordozókhöz kötve.

Felhasználási javaslat

Eredményesen alkalmazható a szervezet ellenálló képességének csökkenése, fáradékonyság, étvágytalanság, elesettség, gyengeség, álmatlanság esetén és azok megelőzésében. Jó hatású a gyakran ismétlődő légúti megbetegedések, közösségi fertőzések megelőzésében vagy tartós betegséget, műtétet követő felépülésben.

Alkalmazás

A felsorolt panaszok esetén testsúly 10 kilogrammonként naponta 5-7 csepp javasolt két részletben. Megelőzésre testsúly 10 kilogrammonként 3-4 csepp. Bevétele étkezés közben, legalább fél dl folyadékban (víz, szörp, tea, gyümölcslé), 50-100 mg C-vitaminnal együtt ajánlott. Tejben, kávéban oldva fogyasztása nem előnyös, mert a felszívódás romlik.

Figyelmeztetés

A Béres Csepp Plusz mellett bármilyen más gyógyszer szedhető, de ajánlatos fél óra várakozási idő betartása a két készítmény bevétele között. Vas- és rézanyagcsere zavarán alapuló betegségek esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 30 ml, 100 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Béres Rt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-248/1991.

Bio-Garten csalánmag elixír

Összetétel

Csalánmag, angyalgyökér, csipkebogyó, borsosmentalevél, kamillavirág, rozmaringlevél, keserűnarancshéj és fahéj mézzel édesített boros kivonata.

Felhasználási javaslat

Általános erősítő, élénkítő, tonizáló hatású gyógytermék. Elősegíti a beteg, kimerült, fokozott pszichés vagy fizikai megterhelésnek kitett szervezet regenerálódását, lassítja az öregedési folyamatokat.

Alkalmazás

Naponta 1 evőkanál (15 ml) bevétele ajánlott a főétkezés után. Kúraszerűen alkalmazva hatásos. A kúra időtartama 6 hét.

Figyelmeztetés:

17% alkoholt tartalmaz! Egy evőkanálnyi elixírben kb. 3 g alkohol és 5 g cukor van.

Felhasználható: 2 évig

Kiszerezési egység: 220 ml, 500ml

Gyárja

Bio-Garten GmbH, Wiegelegasse 12, A-9020 Klagenfurt, Ausztria.

Forgalmazza

RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-254/1991.

Bio-Garten eredetű svédcsépp

Összetétel

17 gyógynövény (szegfűszeg, sáfrány, manna, mirha, szerecsendió, szerecsendió-virág, fahéj, papsajtlevél, fehérmályva-gyökér, nagy ezerjófű, zsályalevél, angyalgyökér, borsosmentalevél, kálmosgyökér, tárnicsgyökér, keserűnarancshéj, gyömbér) keverékének mézzel és malagaborral ízesített alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

Betegség után a fizikai erőnlét javítására, továbbá kimerültség, fáradtság, gyengeség esetén alkalmazható. Szellemi kimerültség ellen is jó hatású. Emésztési panaszokban serkenti a gyomornedv termelését, javítja az epeműködést. Görcsoldó, étvágyjavító.

Alkalmazás

Napi 2 alkalommal egy evőkanál svédcsépp bevétele ajánlott étkezés után, tisztán vagy vízzel hígítva.

Figyelmeztetés

23% alkoholt tartalmaz!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerezési egység: 220 ml, 500 ml.

Gyártja

Bio-Garten GmbH, Wiegelegasse 12, A-9020 Klagenfurt, Ausztria.

Forgalmazza

RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-193/1990.

Bonalax hashajtó pezsgőpor

Összetétel

Magnézium-szulfát, citromsav, borkósav, nátrium-hidrogénkarbonát.

Felhasználási javaslat

Bélrenyhesség és székrekedés esetén ajánlott. Fokozza a bélműködést és egyben savlekötő hatású. Vízben feloldva kellemes ízű hűsítő ital készíthető belőle, ami tartalmazza a keserűs és a hashajtó gyógyvizek hatóanyagait, de nélkülözi azok kellemetlen ízét. Előnye, hogy cukorbeteg is fogyaszthatják.

Alkalmazás

Bélrenyhességben szenvedők naponta 1 tasak tartalmát, krónikus székrekedésben szenvedők napi 2 tasak tartalmát oldják fel 1 pohár vízben vagy gyümölcslében, és lehetőleg pezsgés közben igyák meg reggeli előtt vagy lefekvéskor. Gyermekeknek 6-12 éves korig a felnőtt adagok fele javasolt.

Figyelmeztetés

Bélelzáródás és vesebetegség esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 10 tasak/doboz

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-431/1993.

Bronchicum balzsam

Összetétel

Eukaliptuszolaj, fenyőtűolaj, kámfor.

Felhasználási javaslat

Az alsó és felső légutak megfázásos, hurutos megbetegedéseiben alkalmazható, külsőleg. Kétféle módon csillapíthatja a köhögést és a meghűlést. A bőrbe dörzsölve a test melege az illóolajokat gőzök formájában szabadabbá teszi. Ezeket a beteg belélegzi, és így azok közvetlenül a légutakba jutva gátolják a baktériumok szaporodását és kifejtik nyálkaoldó, gyulladáscsökkentő hatásukat. Ugyanakkor a hatóanyagok a bőrön át is felszívódnak, a vérárammal a légutakba kerülnek, és ott kiegészítő hatást fejtenek ki.

Alkalmazás

A balzsam alkalmazása akkor eredményes, ha naponta többször bedörzsöljük vele a mellkast és a hátat.

Figyelmeztetés

Sérült bőrfelületen, az arcon, különösen az orr területén, illetve szemárványok és fulladásos köhögés esetén használata ellenjavallt! A kezelés során kontaktekcéma előfordulhat. A bőrön és a nyálkahártyán fokozott irritáció léphet fel. A hörgők görcse erősödhet. Más gyógyszerkészítményekkel egy időben történő alkalmazása azok hatását gyengítheti vagy erősítheti.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 55 g.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-441/1993.

Bronchicum cseppek

Összetétel

Kvebracsókéreg-, fehérszappangyökér- és kakukkfűtinktúra, speciális cukorszirup, eukaliptuszolaj és mentol.

Felhasználási javaslat

A készítmény a heveny és idült hörghurut kezelésére szolgál. Oldja a hörgők görcseit, gyulladáscsökkentő hatású, segíti a váladék kiürítését.

Alkalmazás

Csepegtessünk naponta 3-5 alkalommal cukorra vagy forró teába a szerből felnőtteknek 20-30 cseppet, gyermekeknek (6-14 évig) 20 cseppet, kisebb gyermekeknek legfeljebb 15 cseppet.

Figyelmeztetés

A Bronchicum csepp 29,5% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegség esetén vegyék figyelembe, hogy a készítményből 20, illetve 30 csepp 0,02, illetve 0,03 szénhidrát egységnek felel meg. Számukra cukorral történő bevételük tilos! Használat előtt az üveget rázzuk fel! Alkalmazása során gyomornyálkahártya-irritáció előfordulhat.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 30 ml.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-458/1994.

Bronchicum echinacea csepp

Összetétel

Kasvirág (*Echinacea angustifolia*) friss, virágos hajtásából és gyökeréből készült alkoholos kivonat.

Felhasználási javaslat

Erősíti a szervezet ellenálló képességét a vírusokkal és baktériumokkal szemben, így alkalmas a fertőző megbetegedések megelőzésére. Enyhíti a hűléses megbetegedések tüneteit, rövidíti a betegség időtartamát.

Alkalmazás

Felnőttek és serdülők naponta 3-5 alkalommal 1-1 millilitert (azaz 30 cseppet) vehetnek be a készítményből kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés

A Bronchicum Echinacea csepp 30%-os alkoholt tartalmaz!

Felhasználható: 8 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 ml, 100 ml.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer/A. Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-355/1992.

Bronchicum elixír

Összetétel

Grindeliafű, földitömjényökér, kankalinyökér, kakukkfű és kvebracsókéreg tinktúra, továbbá speciális cukorszirup, eukaliptuszolaj és mentol.

Felhasználási javaslat

A Bronchicum elixír a hörgők gyulladása, fokozott váladékképződése esetén alkalmazható. Gyulladáscsökkentő és váladékkoldó növényi kivonat, illóolajtartalmánál fogva enyhíti a fájdalmas köhögést, csökkenti a nyálkahártya duzzadását és könnyíti a légzést.

Alkalmazás

Felnőtteknek 2-3 óránként, naponta legfeljebb 6x1 teáskanálnyi, gyermekeknek életkortól függően naponta 2-3 alkalommal 1/2-1 teáskanálnyi elixír bevétele ajánlott.

Figyelmeztetés

A készítmény 1,5% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegség esetén legyenek figyelemmel arra, hogy 5 ml (1 teáskanálnyi) elixír 0,34 szénhidrát egységnek felel meg. Alkalmazása során gyomornyálkahártya-irritáció előfordulhat.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 130 g.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-457/1994.

Bronchicum inhalátum

Összetétel

Eukaliptuszolaj, fenyőolaj, kakukkfűolaj.

Felhasználási javaslat

A Bronchicum inhalátum növényi eredetű illóolajok keveréke, melyek gőzei a felső légutak nyálkahártyáira fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással vannak. Az inhalátum gőze az orrban, a torokban és a hörgőkben elfolyósítja a nyálkahártyát, így a váladék kiürülését megkönnyíti, ami a hurutos panaszok javulását eredményezi.

Alkalmazás

Naponta 3x5 percen át végezzünk inhalálást. Minden felhasználáshoz 1 adagoló pohár (5 ml) inhalátum emulziót öntsünk egy tálba, és tegyük hozzá 1-2 liter forró vizet. Az arcot hajtsuk a tál fölé, a fejet borítsuk be egy kendővel vagy törülközővel és lélegezzünk mélyen az orron át be, a szájon át ki.

Figyelmeztetés

A készítmény kizárólag külsőleg alkalmazható! Tároljuk jól lezárva! A felnyitott flakont 4 héten belül fel kell használni! Tüdőasztma, szamárköhögés, fulladásos köhögés esetén ellenjavalt! Használata során mellékhatásként a nyálkahártyán fokozott irritáció léphet fel. Ritkábban allergiás tünetek is jelentkezhetnek. A hörgők görcse erősödhet. Más gyógyszerkészítményekkel egy időben történő alkalmazása azok hatását gyengítheti.

Felhasználható: 3 évig, felbontás után 1 hónapig.

Kiszerezési egység: 50 ml.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-444/1993.

Bronchicum kakukkfűtartalmú gyógyfürdő**Összetétel**

Kakukkfű-illóolaj.

Felhasználási javaslat

Gyógyhatása kétféleképpen érvényesül: egyrészt a fürdés során belélegzett illóolaj-tartalmú gőzök tisztítják a légutakat, másrészt a bőrön át felszívódó hatóanyagok a vérkeringés útján jutnak el a légzőszervekhez, és így fejtik ki hatásukat. Alkalmazható légúti megbetegedések, krónikus bronchitis, lázzal nem járó meghűléses betegségek kiegészítő kezelésére.

Alkalmazás

Egy fürdő elkészítéséhez 20-30 ml fürdőolaj felhasználása javasolt. Fürdés után pihenés és a test melegen tartása ajánlott. Szükség esetén naponta egy fürdőt vegyünk.

Figyelmeztetés

Lázzal járó megbetegedések, tuberkolózis, súlyos szív- és keringési elégtelenség, magas vérnyomás esetén ne alkalmazzuk!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 100 ml.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-295/1992.

Bronchicum szirup

Összetétel Földitömjénygyökér, grindeliafű, kankalinygyökér, kakukkfű és rózsatinktúra, valamint méz.

Felhasználási javaslat

A Bronchicum szirup méztartalmú köhögés elleni szirup. Növényi eredetű kivonatok keveréke, melyben a komponensek egymás hatását előnyösen egészítik ki. A grindeliafű baktériumellenes, gyulladásgátló és köptető tulajdonságokkal rendelkezik. A kankalinygyökér és a földitömjén köptető hatású. A kakukkfű oldja a hörgők hűlés okozta görcsét, elősegíti a letapadt váladék felköhögését, antibakteriális hatással is rendelkezik. A készítmény a légzőszervek hurutos megbetegedései esetén segít a tünetek enyhítésében, alkalmazása elsősorban gyermekeknek és terhes anyáknak ajánlott.

Alkalmazás

A Bronchicum szirup szokásos adagja felnőtteknek 3x1 evőkanálnyi, nagyobb gyermekeknek és serdülőknek 3x2 teáskanálnyi, kisgyermekeknek 3x1 teáskanálnyi, csecsemőknek 2-3x1/2 teáskanálnyi.

Figyelmeztetés

A készítmény 1,7% alkoholt tartalmaz! Cukorbetegségűek vegyék figyelembe, hogy 15 ml (1 evőkanál) szirup 1 szénhidrát egységnek, 5 ml (1 teáskanál) szirup 0,35 szénhidrát egységnek felel meg. Használat előtt fel kell rázni. Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 130 g.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-517/1995.

Celladam® csepp és kúp**Összetétel**

Csepp: lipopoliaminok (CDM), 96%-os alkohol.

Kúp (2,5 mg-os): lipopoliaminok (CDM).

Felhasználási javaslat

A készítmények hatóanyaga a szintetikus úton előállított lipopoliamin, amely kedvezően befolyásolja a szervezet ellenálló képességét, megóvhatja a szervezetet, a betegségeket kiváltó környezeti ártalmakkal,

fertőzésekkel szemben. A szer alkalmazható erőtlén állapotok kezelésére is, ilyenkor fokozhatja a folyamatban lévő gyógyszeres kezelés hatékonyságát.

Alkalmazás

A cseppet megelőzés céljából, kúraszerűen 3 hétig javasolt szedni. Betegség esetén a tünetek megszűntéig, de legfeljebb 3 hónapig javasolt szedni 2 naponként 2-3x 15 cseppet kockacukorra cseppentve és elszopogatva. A kúp használata betegség esetén ajánlott, hetente 2-3 alkalommal, időarányosan elosztva.

Figyelmeztetés

A hatóanyaggal szembeni allergia, autoimmun betegségek, a véralvadás zavarai, terhesség, illetve szoptatás esetén a Celladam® ellenjavallt! A kúp alkalmazásának ideje alatt a cseppet ne szedjük!

Alkalmazása során nyálkahártya-érzékenység, tartós szedése esetén enyhe vérnyomáscsökkenés, nyálzás, hasmenés jelentkezhet! Citosztatikumokkal egy időben vagy sugárkezelés mellett nem alkalmazható!

Felhasználható: 6 hónapig.

Kiszerelési egység:

Csepp: 15 ml.

Kúp: 10 db.

Gyártja és forgalmazza

BIOPHARM Kutató és Fejlesztő Kft. 1027 Budapest, Fő utca 68.

Kapható

A csepp gyógynövényszaküzletekben, a kúp gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-091/1989, OGYI-138/1989.

Cholavit cseppek

Összetétel

Benedekfű, cickafarkfű, konyhaköménytermés, borsosmentalevél és rebarbara gyökértörzs alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A Cholavit csepp a máj és az epeműködés zavaraiiban alkalmazható.

Alkalmazás

A készítményből naponta 3x15-20 csepp bevétele ajánlott, kockacukorra cseppentve vagy folyadékkal étkezés előtt vagy étkezés közben.

Figyelmeztetés

A készítmény 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén alkalmazása nem javasolt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövény feldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-309/1992.

Cirkulin fokhagymagyöngy

Összetétel

Aprított száraz fokhagyma.

Felhasználási javaslat

A fokhagyma jótékony hatását az érlelmeszesedés megelőzésében, az öregedés tüneteinek késleltetésében és az emésztési funkciók támogatásában évezredek óta jól ismerik. A Cirkulin fokhagymagyöngy speciális eljárással készült fokhagymakivonatot tartalmaz, így teljes mértékben szagtalan és semleges ízű.

Alkalmazás

6 szem Cirkulin fokhagymagyöngy egy átlagos fej fokhagyma hatóanyag-mennyiségét tartalmazza. Felnőtteknek naponta 3-szor 2 draszté bevétele ajánlott étkezés előtt, kevés vízzel. A kellő hatás elérése érdekében a Cirkulin fokhagymagyöngy fogyasztása kúraszerűen, több hónapon keresztül javasolt.

Figyelmeztetés

Ritkán felléphetnek gyomor és bélpanaszok, allergiás tünetek. A bőr és a lehelet szaga megváltozhat.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 180 draszté.

Gyártja

ROHA GmbH. D-28333 Bremen, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.
Nyilvántartási szám: OGYI-460/1994.

Cirkulin valeriana draszé komlóval

Összetétel

Macskagyökér és komlótoboz száraz kivonata.

Felhasználási javaslat

Túlhajsolt napjainkat követően gyakran nem tudunk kellőképpen lazítani. A nappali stresszhatások elalvási nehézségeket okoznak, így szervezetünk képtelen regenerálódni, és pihenéssel felkészülni a következő napra. A gyógyászatban évszázadok óta alkalmazott természetes alapú valeriána (macskagyökér) és komlókivonatot tartalmazó Cirkulin draszé a hozzá szokás kialakulásának veszélye nélkül segíti az elalvást, oldja a feszültséget és a szorongást.

Alkalmazás

Járművezetők és veszélyes gépeken dolgozók csak este (lefekvés előtt) szedhetik. Nyugtatóként naponta 2-3 alkalommal 1-2 draszé bevétele ajánlott, elalvási nehézség esetén 2-3 draszé 1/2-1 órával lefekvés előtt, kevés folyadékkal bevéve.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 45 draszé.

Gyártja

ROHA GmbH D-28333, Bremen, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-459/1994.

Crataegus cseppek

Összetétel

Galagonya virágos ágvégekből készült vizes-alkoholos kivonat.

Felhasználási javaslat

A galagonya virágos ágvégekből készült alkoholos kivonatot a népi gyógyászatban már régóta használják szívbetegségek gyógyítása. A készítmény a szívkoszorúerek vérellátását és a szívizomzat anyagcseréjét javítja, a szívritmuszavarokat megszünteti, emellett enyhe görcsoldó és nyugtató hatása is van.

Alkalmazás

Naponta 3x10 csepp bevétele ajánlott étkezés előtt.

Figyelmeztetés

Ellenjavallat, mellékhatás, gyógyszerkölsönhatás ez idáig nem ismert.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b.

Forgalmazza

MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest; Balassi Bálint utca 2/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-453/1994.

Crategil oldat

Összetétel

Virágzó galagonya ágveg és bogyó, feketeribizli levél, továbbá citromfű, gyógynövényekből készült kálium és magnéziumsókat, valamint C-vitamint tartalmazó alkoholos kivonat.

Felhasználási javaslat

Kedvezően hat az időskori szívpanaszok, szívdegeneráció megelőzésére, a folyamat késleltetésére. Jól alkalmazható ideges szívpanaszok vagy ezek következtében jelentkező, más gyógyszerek adását nem igénylő, de a betegeknek szubjektív panaszokat okozó szívritmuszavarok kezelésére.

Alkalmazás

Naponta 2-3 alkalommal egy adagoló kanálnyi oldat elfogyasztása ajánlott, kúraszerűen. A szer alkalmazásáról tanácsos kikérni a kezelőorvos véleményét.

Figyelmeztetés

24% alkoholt tartalmaz! Gyermekeknek nem adható! Szívglükozidokkal együtt is szedhető, azok hatását fokozza.

Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig, sötét, hűvös helyen tárolva.

Kiszerelési egység: 230 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-025/1988.

Crotalgin kenőcs**Összetétel**

Texasi csörgőkígyó mérgeinek kivonata, metilszalicilát és kámfor vízzel lemosható kenőcsben.

Felhasználási javaslat

A Crotalgin önálló terápiaként vagy antireumatikumokkal együtt alkalmazható. Reumatikus fájdalmak esetén fájdalomcsökkentésre, elsősorban a végtagok és a hátizomzat fájdalmainak csillapítására a porckorong-elváltozások, isiász, köszvény okozta fájdalmak csökkentésére, továbbá helyi vérbőséget okozó hatásánál fogva sportolás, nehéz fizikai munka végzése esetén az izmok bemelegítésére.

Alkalmazás

Kenjünk a kenőcsből néhány centiméternyit (1-3 cm) a kezelendő bőrfelületre, majd finom masszírozó mozdulatokkal dörzsöljük a bőrbe. A kezelést a fájdalom erősségétől függően naponta 2-4 alkalommal ismételjük meg. Erős fájdalom esetén pakolásként is alkalmazható. A kezelés kezdetén enyhe csípő, égető érzés jelentkezhet, ami 5-10 perc után megszűnik.

Figyelmeztetés

Bőrhoányos helyeken (kiütések, sérülések okozta hegesedés stb.) és az arcon nem alkalmazható! Egyéni érzékenység esetén a Crotalgin kenőcs okozta csípő érzés, illetve enyhe bőrpír tartósan fennmaradhat, ilyenkor a kezelést abba kell hagyni!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 60 g.

Gyártja

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő utca 101.

Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-107/1989.

Deep heat reumás tüneteket enyhítő és izomlazító kenőcs**Összetétel**

Mentol, metilszalicilát, eukaliptuszolaj.

Felhasználási javaslat

Reumatikus fájdalmak, izomgyulladás, lumbágó, isiász, különböző eredetű izomgörcsök, izomfájdalmak enyhítésére alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 2-3 alkalommal bedörzsöljük az érintett testfelületet, és addig masszírozzuk, amíg a kenőcs fel nem szívódik.

Figyelmeztetés

Kizárólag ép, sértetlen bőrfelület kezelésére alkalmas! Mentolra érzékenyeknek, csecsemőknek és gyermekeknek nem ajánlott a használata. Alkalmazása során bőrirritáció előfordulhat. Amennyiben bármilyen elváltozás alakul ki, a kezelést abba kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 35 g.

Gyártja

Mentholatum Co. Ltd. Longfield Road, Twiford, Berkshire, RG 10 9AT, Nagy-Britannia.

Forgalmazza

MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-311/1992.

Deep heat reumás tüneteket enyhítő és izomlazító spray**Összetétel**

Metil-nikotinát, 2-hitroxietil-szalicilát, metil-szalicilát, etil-szalicilát.

Felhasználási javaslat

Izomgörcs, rándulás, zúzódás, isiász, izom- és reumatikus fájdalmak enyhítésére alkalmazható.

Alkalmazás

Felrázás után kb. 15 cm távolságról fújjuk a készítményt a fájó testfelületre, kétszer-háromszor, rövid ideig. Bedörzsölni nem szükséges.

Figyelmeztetés

Szembe, sérült bőrfelületre ne kerüljön, és nem szabad belélegezni. 5 éves kor alatti gyermekek esetében alkalmazása nem javasolt! A bőr bármilyen elváltozása esetén orvoshoz kell fordulni!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 150 ml.

Gyártja

Mentholatum Co. Ltd. Longfielth Road, Twyford, Berkshire, RG 10 9AT, Nagy-Britannia.

Forgalmazza

MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-312/1992.

Depsorin kenőcs

Összetétel

Gyógynövénykivonat vazelin típusú, zsíros kenőcsben.

Felhasználási javaslat

A pikkelysömör helyi kezelésére.

Alkalmazás

Kenjük a kenőcsöt az érintett bőrfelületre naponta egyszer. A legjobb este zuhanyozás után. 1 óra múlva a fel nem szívódott készítményt távolítsuk el.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 80 g.

Gyártja és Forgalmazza

VÉNUSZ Kft. 2370 Dabas, Park utca 5.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-131/1989.

Depuran kapszula

Összetétel

Szennakivonat, ánizsolaj, köményolaj.

Felhasználási javaslat

Akut és krónikus székrekedés, röntgenvizsgálat előkészítése, műtét utáni bélrenyheség, továbbá aranyeres panaszok esetén és székletszabályozásra alkalmazható. Görcsoldó hatású illóolajokat is tartalmaz, melyek elősegítik az esetleges puffadtság megszüntetését.

Alkalmazás

Felnőtteknek és 12 év fölötti gyermekeknek este lefekvés előtt 1 kapszula bevétele ajánlott, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal. Makacs székrekedés esetén egyszerre 2-3 kapszulát is be lehet venni. A készítmény 8-10 óra múlva hat.

Figyelmeztetés

Bélelzáródás, terhesség és szoptatás esetén, valamint 12 éven aluli gyermekek részére ellenjavallt! Szívglükózidok egyidejű szedése esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét! A vizeletet pirosra festheti. Hosszabb időn át való szedése nem javasolt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 20 kapszula.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallee 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-286/1992.

Diuro cseppek

Összetétel

Cseresznye- és meggyterméskocsány, zsurlófű, aranyvesszőfű medveszőlőlevél és nyírfalevél alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A Diuro csepp enyhe vízajtó hatású készítmény; amely a vesekőképződés megelőzésére, valamint a vesehomok és az apróbb vesekövek eltávolítására alkalmazható egyidejűleg nagy mennyiségű folyadék fogyasztása mellett.

Alkalmazása

Naponta 3-5 alkalommal 20-30 csepp bevétele ajánlott bőséges mennyiségű vízzel vagy teával.

Figyelmeztetés

Terhesség esetén nem fogyasztható! 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén alkalmazása nem javasolt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 50 ml.

Gyártja

Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-314/1992.

Dohányzás elleni teakeverék

Összetétel

Fehér ürömfű, tárnicgyökér, borsosmentalevél.

Felhasználási javaslat

A naponta többszöri szájöblítés a teakeverékből készített szájvízzel (az intenzív keserű íz miatt) csökkenti a dohányzás utáni vágyat, és elősegíti a dohányzástól való leszokást.

Alkalmazás

Fél liter vízhez adjunk 2 tetézett evőkanálnyi teakeveréket, és forraljuk 2-3 percig. Hagyjuk 10 percig állni, szűrjük le, és végezzünk a főzettel naponta többször tartós szájöblögetést.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 100 g.

Gyártja

Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-046/1988.

Echinacea cseppek

Összetétel

Piros kasvirág frissen préselt, vizes-alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A szervezet ellenálló képességének fokozására, meghűléses, influenzás megbetegedések megelőzésére alkalmazható. Szedését célszerű a megbetegedés legelején megkezdeni, sőt, még a betegség kialakulása előtt, megelőzés céljából.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 20 csepp bevétele ajánlott étkezés után, kevés folyadékkal. Meghűlés esetén naponta 2-szer 50 cseppet vegyünk be.

Figyelmeztetés

A készítmény 20% alkoholt tartalmaz! Alkoholtartalma miatt máj és alkoholbetegek, epilepsziások, agysérültek, terhes nők és gyermekek számára nem ajánlott!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 100 ml.

Gyártja

SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruekmühl, Németország

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-335/1992.

Echinacin oldat

Összetétel

Piros kasvirág frissen préselt levelének alkoholos-vizes kivonata.

Felhasználási javaslat

A készítmény erősíti az immunrendszert, növeli a szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben. Az ismételt jelentkező fertőzések megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésre alkalmazható. A cseppeket folyadékban (pl. víz, tea, gyümölcslé) ajánlott be venni. Az első alkalommal (lökésterápiaként) 40 cseppet, majd 1-2 óránként 20 cseppet kell bevenni: A második naptól naponta 3x20, csepp szedhető.

Figyelmeztetés

Előrehaladott krónikus betegségek, valamint fészkes virágzatú növényekkel szemben fennálló érzékenység esetén nem alkalmazható! Az oldat 22% alkoholt tartalmaz! Folyamatosan 8 hétnél hosszabb ideig nem szedhető!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 25 ml, 50 ml, 100 ml.

Gyártja

Madaus AG, D-51109 Köln, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-474/1994.

Egaver szemölcs elleni ecsetelő**Összetétel**

Almasav és citromsav vizes oldata.

Felhasználási javaslat

A szemölcsök a kéz és lábfejen, a térden vagy az arcon megjelenő és gyorsan szaporodó érdes felszínű, kemény tapintású, bőrszínű, fényes, lapos formában megjelenő növedékek. Az Egaver szemölcs elleni ecsetelő hatóanyagait (növényi savakat) a népgyógyászat régóta sikeresen alkalmazza a szemölcsök kezelésére. Orvosi kipróbálás során bizonyították, hogy az Egaver különösen az ifjúkori szemölcsök (verruca plana juvenilis) kezelésére alkalmas.

Alkalmazás

Az Egaverrel (lehetőleg az esti mosakodás után) óvatosan ecseteljük be a beteg bőrfelületet. Az ép bőrre került ecsetelő folyadékot gondosan le kell törölni. A hatásosságot fokozza a napi kétszeri kezelés. A szemölcs nagyságától függően a gyógyulási idő 3-6 hét. A szemölcsök kiújulása esetén a kúra megismételhető.

Figyelmeztetés

A szem és a szájnyálkahártya közelében óvatosan alkalmazható. Anyajegyvet vagy olyan növedéket, ami nem biztosan szemölcs, ne kezeljen! Szükség esetén kérje ki az orvos tanácsát!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 10g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-011/1986.

Elhízás elleni teakeverék**Összetétel**

Kutyabengekéreg, lestyángyökér, borsosmentalevél, aranyvesszőfű, édesköménytermés és bodzavirág.

Felhasználási javaslat

A teakeverék alkotórészei hashajtó és enyhe vízajtó hatással rendelkeznek. Alkalmazása során csökkenti a tápanyagok felszívódását, megakadályozza a túlnyomórészt zöldegekből álló fogyókúra étrend gyakori kellemetlen puffadásos tüneteit.

Alkalmazása

Tasakolt és filteres formában kerül forgalomba. Öntsünk le 1 csészényi (2 dl) forró vízzel 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket, időnként kevergetve hagyjuk hűlni 10 percig, majd szűrjük le. A filter tasakot tegyük 2 dl forró vízbe, majd hagyjuk 10 percig állni. Reggel 1 csészével, délután és este étkezés előtt fél órával egy újabb adagot megosztva, édesítés nélkül fogyasszuk.

Figyelmeztetés

Használatával egyidejűleg kalóriaszegény étrendről kell gondoskodni! Fogyasztása kúraszerűen (4-6 hét) javasolt.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g, 25 filter.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-079/1988.

Epasel kapszula**Összetétel**

Tengeri halolaj (18% EPA + 12% DHA), szelént tartalmazó élesztőpor, E-vitamin.

Felhasználási javaslat

A készítmény a szív és a keringési rendszer megbetegedéseinek megelőzésére, az érlemeszesedés kialakulásának lelassítására, a szívinfarktus veszélyének csökkentésére szolgál. Együtt tartalmazza a koleszterin és triglicerid szintet is csökkentő Omega 3-zsírsavakat, a szív működéséhez elengedhetetlen fontosságú szelént, valamint a védő hatású E-vitamint. Más irányú kutatások bizonyítják, hogy a szelén tartós bevitele a reumatikus, ízületi fájdalmakat csökkenti, az ízületi porcok minőségét javítja.

Alkalmazás

Felnőtteknek naponta 2-3 alkalommal 2 kapszula bevételre javasolt étkezéskor. A hatás kúraszerű (4-5 hónapos) szedés esetén optimális.

Figyelmeztetés

Vérzékenység esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 60 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-147/1990.

Epavir tabletta**Összetétel**

Tengeri halolajból nyert Omega-3 politelítetlen zsírsavak L-lizinnel alkotott sója.

Felhasználási javaslat

A szájon, szájüregben, nemi szerveken és egyéb testfelületeken előforduló herpes simplex fertőzés kezelésére szolgál. Előnyösen alkalmazható a vírusfertőzés kezdeti szakaszában kialakuló tünetek megelőzésére, visszaszorítására.

Alkalmazás

Felnőtteknek naponta 4x2 tabletta, gyermekeknek 30 kilogrammos testsúly alatt naponta 4x1, 30 kilogrammos testsúly felett naponta 4x2 tabletta étkezés utáni bevételre ajánlott a tünetek megszűnéséig.

Figyelmeztetés

Vérzési rendellenességben szenvedők csak fokozott elővigyázatosság mellett szedhetik!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 30 tabletta.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-245/1991.

Epovit olaj és kapszula**Összetétel**

Ligetszépe magjából, kinyert olaj, E-vitamin.

Felhasználási javaslat

Az Amerikában őshonos ligetszépe olaja nélkülözhetetlen esszenciális zsírsavakat tartalmaz. Javítja a koronáriakeringést, enyhíti az anginás panaszokat, csökkenti a pulmonális hipertóniát. Ezért használható érrendszeri megbetegedések megelőzésére és kezelésére. Ezen kívül elsősorban atópiás ekcémában szenvedőknek és a menstruációt megelőző panaszok enyhítésére javasolt; továbbá sclerosis multiplex, valamint reuma és ízületi bántalmak esetén a kezelés kiegészítésére.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula, illetve 10-15 csepp olaj bevétele ajánlott étkezés előtt. Szedése kúraszerűen hatásos. A kúrát a menstruációs panaszok enyhítésére 2 héttel a menses várható időpontja előtt célszerű elkezdni.

Figyelmeztetés

Epilepszia esetén ellenjavallt! Alkalmazása során előfordulhat émelygés, hasmenés, fejfájás.

Felhasználható

Olaj: 1 évig.

Kapszula: 3 évig.

Kiszerelési egység

Olaj: 30 ml.

Kapszula: 60, illetve 120 db.

Gyártja és Forgalmazza

BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-291/1992, OGYI-270/1992.

Epovit plussz kapszula

Összetétel

Ligetszépe magjából kinyert olaj, tengerihalolaj, E-vitamin.

Felhasználási javaslat

A magas vérkoleszterinszintet és a trombólizshajlamot csökkenti. Mérsékeltén vérnyomáscsökkentő hatású, így alkalmazható érrendszeri betegségek megelőzésére, illetve a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. A pikkelysömör (diéta mellett) és a sclerosis multiplex tüneteit enyhíti. Rheumatoid arthritisben szenvedők számára lehetővé teszi a gyulladásgátló gyógyszerek elhagyását vagy csökkentését.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 2 kapszula bevétele javasolt, étkezés előtt. Tartós, kúraszerű alkalmazása javasolt.

Figyelmeztetés

Alkalmazása során émelygés, hasmenés, fejfájás ritkán előfordulhat. A tünetek a kiindulási adag csökkentésével mérsékelhetők. Epilepszia esetén ellenjavallt! Magas vérnyomásban szenvedő betegek alkalmazása előtt kérjék ki az orvos véleményét.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 60 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-300/1992.

Eucabal N

Összetétel

Kámforolaj, fenyőtűolaj.

Felhasználási javaslat

Az illóolajok elősegítik a hörgőváladék elfolyósodását, megkönnyítik kiürülését. A készítmény alkalmazható légúti fertőzésekben, (különösen a hörgők megbetegedéseiben, az orr és a garat nyálkahártyájának enyhe gyulladása esetén), valamint a felső és mélyebb légutak különböző eredetű izgalmi állapotokban.

Alkalmazás

Felhasználható akár naponta többször a mellkas és a hát bedörzsölésére, forró vízbe téve inhalálásra (ennek megkönnyítésére Eucabal inhalátor is alkalmazható) vagy fürdővízbe téve.

Figyelmeztetés

Bedörzsölésre az arc és az orr területén nem alkalmazható! Fürdőadalékként nagyobb bőrsérülések, heveny bőrbetegségek, súlyos lázas és fertőző betegségek, szívelégtelenség, magas vérnyomás esetén csak az orvossal történt megbeszélés után használható!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 40 ml, 100 ml.

Gyártja

ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-385/1993.

Étvágygerjesztő teakeverék**Összetétel**

Ezerjófű, fehér ürömfű, citromfű, benedekfű, borsosmentalevél, fehérmályva-gyökér, édesgyökértörzs, kálmosgyökér, édesköménytermés, kutyabengékéreg.

Felhasználási javaslat

A teakeverék hatóanyagai (a keserűanyagok és illóolajok) elősegítik az emésztőnedvek elválasztását, étvágygerjesztő hatásúak. Javítják az emésztési folyamatokat, csökkentik a puffadásos tüneteket, valamint a bélműködést serkentve enyhe hashajtóhatásúak.

Alkalmazás

Forraljunk 1-2 percig egy tetézt evőkanálnyi teakeveréket 2 dl vízben, majd lefedve hagyjuk hűlni. Szűrjük le, étkezés előtt fogyasszunk az így elkészített teából 1-1 csészével délben és este.

Figyelmeztetés

Terhesek és szoptató anyák nem fogyaszthatják! 3-4 hetes kúra után adagolási szünet beiktatása javasolt!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-077/1988.

Ferrocomp tableta**Összetétel**

Fém-poligalakturonát és vitamin vegyes komplex formában (vas, cink, réz, mangán, kobalt, folsav, valamint C-vitamin).

Felhasználási javaslat

A Ferrocomp tableta jól alkalmazható a szervezet különböző okok következtében fellépő vasvesztése esetén. Például felnőttéknél krónikus vérvesztés (a reproduktív életszakaszban lévő nők havi vérzése), a nem kielégítő mennyiségű, illetve minőségű táplálkozás következtében előálló elégtelen vasbevitel, csökkent felszívódás következtében létrejött vashiányos állapotok megszüntetésére.

Alkalmazás

Felnőtteknek és 12 éves kortól gyermekeknek napi 2 alkalommal 1-2 tableta, súlyosabb vashiányos állapotban 3 alkalommal 1-2 tableta, gyermekeknek 3-12 éves korig napi 1/2-1 tableta bevétele ajánlott, étkezés után. Enyhébb diéta, vegetáriánus étrend, nőknél a rendszeres havi vérvesztés, fokozott szellemi, fizikai igénybevétel okozta vashiány esetén 10 napig napi 2x 1 tableta, majd 20 napig napi 1 tableta szedése elegendő. A kúra az előzőekben ismertetett okok további fennállása esetén 3-6 havonta megismételhető. Súlyosabb vashiány esetén 2-3 hétig napi 3 alkalommal 1-2 tableta, majd 4-8 hétig 2x1 tableta szedése javasolt. Ezt követően célszerű ellenőriztetni a szervezet vasraktárainak állapotát, és ha szükséges, napi 1 vagy 2 tableta szedésével a kúrát folytatni kell.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 20 vagy 40 tableta.

Gyártja és Forgalmazza

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-413/1993.

Fitotussin szirup gyermekeknek**Összetétel**

Borostyánlevél, kakukkfű, hársfavirág és ánizstermés kivonata, valamint szalmiáksó.

Felhasználási javaslat

Köhögéscsillapító és köptető hatású, a felső légúti megbetegedések (torokgyulladás, hörghurut, légcsőhurut, száraz köhögés) kezelésére alkalmazható készítmény. Aromás ízű és illatú.

Figyelmeztetés

2% alkoholt tartalmaz.

Felhasználható: 1 évig, a felbontás után 1 hónapig.

Kiszerelési egység: 145 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-261/1991.

Floradix formula kräuterblut-S szirup

Összetétel

Vas-II-glukonát, vitaminok (B1, B2, B6, B12, C) és gyógynövény kivonatok.

Felhasználási javaslat

A készítmény vashiány megelőzésére alkalmazható, nagyfokú vérvesztésnél (pl. menstruáció), fokozott vasszükséglet esetén (terhesség; szoptatás), gyermekkorban, betegség utáni lábadozás időszakában és általános erősítésre.

Alkalmazás

Felnőtteknek és 10 év fölötti gyermekeknek naponta 2x1/2 mérőpohárnyi, gyermekeknek 6 éves korig 2x1/4 mérőpohárnyi, 10 éves korig 3x1/4 mérőpohárnyi szirup bevétele ajánlott fél órával étkezés előtt, lehetőleg hűtve. Egyéb esetekben (terhesség, szoptatás, vegetáriánus étrend) a napi adag 4x1 mérőpohárnyira emelhető. 3 mérőpohárnyi készítmény kb. 45 mg jól értékesíthető kétértékű vasat tartalmaz. Kúraszerű alkalmazása javasolt, amely legalább 2 hónapig tartson.

Figyelmeztetés

Szedése során a széklet elszíneződik a vastartalom miatt, és a fogak felületén is lehet kis elszíneződés, mely citromlével eltávolítható. A tetraciklinek és a penicillin felszívódását gátolja! Savmegkötő készítménnyel együtt min. 2 óra eltolódással szedhető!

Felhasználható: 3 évig, felbontás után 14 napig.

Kiszerezési egység: 250 ml.

Gyártja

SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország.

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-337/1992.

Fumago krém

Összetétel

Füstike szárából, leveléből és virágából készült aktív fumarátokat tartalmazó kivonat, valamint a borágó telítetlen zsírsavakban különösen gazdag olaja, vízben lemosható krémbe.

Felhasználási javaslat

Főként psoriasisban, azaz pikkelysömörben szenvedő betegek fenntartó kezelésére ajánlott, valamint azoknak, akiknek bőre a normálistól eltérően hajlamos a kiszáradásra és a megvastagodásra, vagy akiknél az egyenetlen bőrfelszín vékony ezüstszerű rétegekben válik le.

Alkalmazás

Az érintett testfelszínt a tünet súlyosságától függően kenjük be vékonyan naponta 2-3 alkalommal, majd enyhe masszírozással dörzsöljük a bőrbe.

Figyelmeztetés

Ha a kezelés helyén mással összefüggésbe nem hozhatóan a bőr hirtelen gyulladttá válik, haladéktalanul a kezelőorvoshoz kell fordulni, és a krém alkalmazását fel kell függeszteni!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 50 g.

Gyártja

Gradiens Kft. 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 4.

Forgalmazza

Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-512/1995.

Galama tonikum

Galama tonikum cukormentes

Összetétel

Árnika, kamilla, levendula, kankalin, citromfű, rozmaring, galagonya, libapimpó, veronika, viola, narancshéj, macskagyökér, ratániagyökér és komló alkoholos-vizes kivonata.

Felhasználási javaslat

Álmatlanság, alvászavar, szorongás, nyugtalan, feszült állapotok leküzdésére, ideges szívpanaszok, ritmuszavarok kezelésére, a legyengült szív erősítésére alkalmas.

Alkalmazás

Naponta 3x1 evőkanálnyi Galama tonikum bevétele ajánlott.

Figyelmeztetés

Árnikaallergia, felismert kankalinallergia esetén alkalmazása ellenjavallt.

A készítmény 14-17% alkoholt tartalmaz!

Felhasználható: 4 évig.

Kiszerelési egység: 350 ml.

Gyártja

Queisser Pharma GmbH. D-24914 Flensburg, Németország.

Forgalmazza

Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-378/1993, OGYI-379/1993.

Galexier gyógykeserű**Összetétel**

13 féle gyógynövényből készült főzet.

Felhasználási javaslat

Az emésztést serkentő keserűanyagokat tartalmazó, kellemes ízű, alkoholmentes gyógykeserű. Hatásában fontos szerepe van az articsókának, amelynek fő hatóanyaga, a cynarin a keserű anyagokkal együtt májvédő, méregtelenítést fokozó hatású. A keserűanyagok serkentik a zsíremésztéshez szükséges epetermelést, és jótékonyan hatnak étkezés utáni teltségérzet és puffadás esetén. Mindezt kiegészíti az édeskömény és a kamilla illóolajának enyhe görcsoldó, szélhajtó és gyulladáscsökkentő hatása.

Alkalmazás

Naponta 3-szor 10 ml bevétele ajánlott étkezéskor vagy étkezés után. Étkezés előtt fogyasztva étvágyjavítóként hat.

Figyelmeztetés

Súlyos májműködési zavarok, májelégtelenség, az epevezeték elzáródása, epehólyag-gyulladás esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig, felbontás után 2 hétig.

Kiszerelési egység: 250 ml.

Gyártja

SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzleteiben.

Nyilvántartási szám: OGYI-334/1992.

Gallmed tableta**Összetétel**

Fehérmályva gyökér, orvosi pemetefű, borsosmentalevél, anyalevél, édesköménytermés, édesgyökértermés, fehér ürömfű, epe kivonat.

Felhasználási javaslat

A Gallmed epe- és emésztőrendszeri problémákat enyhítő készítmény. Csökkenti, megszünteti az epetermelés és az epeutak működési rendellenességeivel összefüggő panaszokat, így fokozza az epe ürülést, elősegíti az epehajtást; csökkenti az epekőképződés veszélyeit, enyhíti, megszünteti az epehólyag eltávolítása után az epevezeték működési zavara következtében jelentkező panaszokat. Csökkenti, megszünteti az emésztőrendszeri panaszokat, különösen a gyomor túlterhelése esetén, elősegíti a székelési panaszok rendeződését, a székletszabályozást (rendszeretlen, kemény széklet stb.). Ezen kívül előnyösen befolyásolja a koleszterinszintet.

Alkalmazás

Naponta 1-8 alkalommal 1-2 tableta bevétele ajánlott a főétkezések előtt.

Figyelmeztetés

Heveny eperohamok alatt, elzáródásos sárgaságban és terhesség esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 20 db filmtabletta.

Gyártja és Forgalmazza

NICO Kft. 6500 Baja, Szarvas G. utca 3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-503/1995.

Genia® 92 hüvelykúp

Összetétel

Laktamin, laktóz, tejsav és folsav.

Felhasználási javaslat

A készítmény hüvelyfertőzések megelőzésére, nem fertőzőes hüvelyfolyások, fogamzásgátló tabletták, egyéb gyógyszerek, méhen belüli eszközök stb. okozta fokozott hüvelyváladékozás esetén, továbbá az orvos által előírt célzott kezelés kiegészítésére alkalmazható.

Javítja és fenntartja a hüvely élettani egyensúlyát, megszünteti a nem fertőzőes eredetű hüvelyfolyásokat, gyulladásokat. Segíti a hüvelyhám gyógyulását és növeli annak ellenálló képességét a különféle mikroorganizmusokkal szemben.

Alkalmazás

Este, lefekvés előtt, tisztálkodás után 1 kúpot kell mélyen felhelyezni a hüvelybe. Egy kúra időtartama 10 nap, a tünetek újbóli észlelése esetén igény szerint ismételtethető.

Figyelmeztetés

Célzottan nem kezelt fertőzőes eredetű és sebészi beavatkozást igénylő folyamatok esetén, továbbá fiatal leánygyermek számára ellenjavallt!

Alkalmazása során egyéni túlérzékenység esetén átmeneti csípős érzés előfordulhat.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 10 kúp.

Gyártja

VEPEX Kft. 1027 Budapest, Frankel Leó utca 26.

Forgalmazza

AZÚR Kereskedelmi Rt. 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-237/1991.

Gerivit pharmaton kapszula

Összetétel

Standardizált ginzengkivonat, vitaminok (A, B1, B2, B6, B12, C, D és E), nikotinamid, kalciumpantotenát, rutin, vas, kalcium, foszfor, fluor, réz, kálium, mangán, magnézium, cink, lecitin, dimetil-aminoetil-bitartarát.

Felhasználási javaslat

Kimerültség, fáradtság, gyengeség és csökkenő koncentrációs készség, továbbá elégtelen vagy egyoldalú táplálkozás, elhúzódó lábadozás esetén és az általános ellenálló képesség fokozására ajánlott. Alkalmas az általános időskori tünetek megelőzésére, és az idős korral együtt járó vitamin és ásványianyaghiány pótlására, kezelésére.

Alkalmazás

Az alkalmazás kezdetén, az első 2-3 héten naponta 2x1 kapszula bevétele ajánlott (reggelihez és ebédhez). A későbbiekben már elegendő reggel egy kapszula.

Figyelmeztetés

Fennálló kalcium-anyagcsere-zavar, veseműködési zavarok, A-vitamin és D-vitamin túladagolás veszélye esetén ellenjavallt! Igen ritkán szedése során felléphetnek gyomor és bélrendszeri mellékhatások (pl. teltségérzés, gyomorfájás, hányás). Ebben az esetben orvoshoz kell fordulni.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 30 kapszula.

Gyártja

PHARMATON S. A. Via Mulini, CH-6934 Lugano-Bioggio, Svájc.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-326/1992.

Gincosan pharmaton kapszula

Összetétel

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) leveléből és Panax ginseng gyökeréből készült standardizált kivonat.

Felhasználási javaslat

A szellemi teljesítőképesség, koncentrációképesség csökkenése és az emlékezőtehetség romlása esetén alkalmazható. Az érlemeszesedés tünetei közül segít a szédülésen, feledékenységen, hangulathullámmáson, csökkenti az alkalmazkodóképesség és kapcsolattartás nehézségeit.

Alkalmazás

Szokásos adagja naponta 2-szer 1 kapszula, amit reggeli és ebéd után, összerágás nélkül, folyadékkal javasolt bevenni. A kezelést általában 4 hétig kell folytatni.

Figyelmeztetés

Ritkán mellékhatásként fejfájás, emésztési zavarok vagy allergiás bőrreakciók léphetnek fel.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 30 kapszula.

Gyártja

PHARMATON S. A. Via Mulini, CH-6934 Lugano-Bioggio, Svájc.

Forgalmazza

NATURPORDUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-325/1992.

Gingisol fogínyecsetelő

Összetétel

Kámfor, mentol, kamillaolaj, szegfűszegolaj alkoholos vizes oldatban.

Felhasználási javaslat

Helyi ecsetelőként alkalmas az ínygyulladásos állapotok (pl. protézis, híd, korona által kiváltott lokális ínygyulladás), afták, valamint eróziós ínygyulladás kezelésére, a fogínysorvadás okozta érzékenység enyhítésére, csökkentésére.

Alkalmazás

Naponta 2-4 alkalommal, a fogmosást követően célszerű a használata. Alkalmazása a nyálkahártyát nem károsítja, fogelszíneződést nem okoz.

Figyelmeztetés

A komponensekkel szembeni túlérzékenység esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 10 ml.

Gyártja és Forgalmazza

MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b.

Kapható

Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben, és viszont-eladóknak a Herbaház Gyógytermék Nagykereskedésben. 1077 Budapest, Rózsa utca 47.

Nyilvántartási szám: OGYI-483/1994.

Ginkgo draszté

Összetétel

Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) levelének szárított kivonata.

Felhasználási javaslat

Értágító hatású, javítja az agyi vérellátást, és ezáltal az oxigénellátást. Agyi keringési zavarok, agyi érlemeszesedés okozta időskori szédülési panaszok, emlékezetzavarok, fejfájás és indokolatlan fáradékonyság esetén alkalmazható. Kedvező hatású a cukorbetegség szövődményeként fellépő szemészeti érrelváltozások (retinopátia) kiegészítő kezelésénél.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 draszté bevétele ajánlott.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 40 draszté.

Gyártja

SALUS-HAUS Bahnhofstrasse 24., D-8206 Bruckmühl, Németország.

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-336/1992.

Gyermek teakeverék

Összetétel

Kamillavirág, édesköménytermés, borsosmentalevél, ánizstermés és fehérmályva levél.

Felhasználási javaslat

A tasakolt és filteres kivitelben is kapható teakeverék görcsoldó, emésztést javító, enyhe gyulladáscsökkentő hatású. Gátolja a bélgázok képződését, csökkenti a puffadást.

Alkalmazás

Csecsemőknek 4 hónapos kor felett 1 mokkáskanálnyi, gyermekeknek 1 csapott kávéskanálnyi teakeveréket tegyünk 2 dl forrásban lévő vízbe, hagyjuk állni 10-15 percig, majd szűrjük le. Filterezett készítmény esetén egy filtertasakból készítsünk 10-15 perces áztatás után halványsárga teát. Az elkészített teát szükség szerint naponta több részletben, langyosan, megfelelően ízesítve (pl. méz) itassuk meg.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g vagy 25 filter.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-047/1988.

Halolaj kapszula

Összetétel

Tengerihalolaj koncentrátum.

Felhasználási javaslat

Rendszeres használata lassítja az erek elmeszesedését és csökkenti a vér kóros alvadékonyságát, ezáltal fontos tényező lehet a trombózis és a szívinfarktus megelőzésében.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele ajánlott.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 100 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-169/1990.

Harmónia változáskori tüneteket enyhítő teakeverék

Összetétel

Borsosmentalevél, cickafarkfű, citromfű, édesköménytermés, kamillavirág, koriandermag, kutyabengekéreg, rozmaringlevél, tarackbúza, orvosizsálya levél, zsurlófű.

Felhasználási javaslat

A teakeverék alkalmazása során csökkenti a változáskori kellemetlen tüneteket, a feszültség okozta emésztőrendszeri panaszokat, alvászavarokat, hangulati hullámzásokat, és mérsékli a kellemetlen hőhullámokat.

Alkalmazás

Öntsünk le 1-2 kávéskanálnyi teakeveréket 1 csészenyi (2 dl) forró vízzel és hagyjuk fél órát állni. Az így elkészített teából reggel és este fogyaszthatunk 1-1 csészével.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-120/1989.

Herbalax kapszula

Összetétel

Tisztított szennakivonat és szilvasűrítmény.

Felhasználási javaslat

A Herbalax kapszula kíméletes hatású, növényi eredetű hashajtó, mely eredményesen alkalmazható akut és krónikus székrekedés, renyhe bélműködés, valamint gyomorbántalmak és emésztési zavarok esetén. A tisztított szennakivonat a vékonybélben szivódik fel, és a vastagbélben fejti ki hatását. A bélbaktériumok hatására szabadul fel a hatóanyag, amely fokozza a bél perisztaltikus mozgását, valamint növeli a víz és az elektrolitok mennyiségét a bélben. A szilvasűrítvény enyhe hashajtó, elsősorban növényi savakat, pektint és vízben duzzadó nyálkaanyagot tartalmaz. A népi gyógyászatban már régóta ismerik hatását.

Alkalmazás

Alkalmazása során gyermekeknek napi 1-2 kapszula, felnőtteknek az egyéni érzékenységtől függően 2-5 kapszula bevétel ajánlott, étkezés után. Hatását kb. 8-10 órával a bevétel után fejti ki, ezért célszerű este fogyasztani.

Figyelmeztetés

A gyomor és a bélrendszer gyulladással megbetegedéseiben, bélelzáródás vagy annak gyanúja, nehezen beállítható cukorbetegség esetén, valamint terheseeknek; szoptató anyáknak és 6 éves kor alatti gyermekeknek ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 30 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOEXTRA Kft. 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-559/1995.

Herpesil gél és ecsetelő

Összetétel

Kerti kakukkfű, citromfű, aranyvesszőfű, kamillavirág, tüdőfű, vérehulló fecskefű cirokszulfátot is tartalmazó alkoholos kivonata gél, illetve oldat formájában.

Felhasználási javaslat

Kizárólag a száj és az orr környékén jelentkező herpes simplex vírusfertőzés helyi kezelésére alkalmazható. A fertőzés korai stádiumában a helyi kezelés megakadályozza a gyulladás kialakulását az ajkakon, jelentősen megrövidíti a gyógyulás idejét (7-10 napról 4 napra), meghosszabbítja a fertőzések ismétlődése közötti időtartamot.

Alkalmazás

Bőrpír és hólyagos állapot esetén ecsetelővel napi 5-10 ecsetelés javasolt. Éjszakára, illetve a pörkök kialakulásakor célszerű a gél alkalmazása napi 1-3 alkalommal.

Figyelmeztetés

A szem és a szem környékén előforduló vírusfertőzés esetén nem használható!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 10g-10g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-060/1988, OGYI-059/1988.

Heumann gyomorbántalmak elleni instant gyógytea (Solu-Vetan® NG)

Összetétel

Édesgyökér, borsmenta levél száraz kivonata és mikrokapszulázott borsosmentaolaj.

Felhasználási javaslat

A tea fogyasztása telítettségérzés, puffadás esetén javasolt, továbbá gyomornyálkahárta gyulladás, gyomor és nyombélfekély esetén a gyógyszeres kezelés kiegészítésére.

Alkalmazás

Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port, egy csésze forróvízben. Az így elkészített teából naponta 3-5 csészényit fogyaszthatunk. Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 6 hétig javasolt (reggel éhgyomorral és/vagy este lefekvés előtt 1-1 csésze tea elfogyasztásával).

Figyelmeztetés

A készítmény 0,95 g szénhidrátot tartalmaz! Máj és epebetegség, magas vérnyomás, csökkent szérumkáliumszint, terhesség, szív működési zavarok, illetve bélelzáródás esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 g.

Gyártja

Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.

Forgalmazza

Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-432/1993.

Heumann hashajtó hatású instant gyógytea (Solubilax® N)

Összetétel

Szennalevél és kutyabengekéreg kivonata.

Felhasználási javaslat

A bélműködés szabályozására, székrekedés kialakulásának megakadályozására, hashajtásra, aranyeres megbetegedések kiegészítő kezelésére szolgál.

Alkalmazás

Oldjunk fel 1/2-1 teáskanálnyi port egy csésze (kb. 2 dl) forró vízben, majd tetszés szerint ízesítve az így elkészített teát esténként fogyasszuk. Ajánlatos először 1/2 teáskanálnyi por hatását kipróbálni, aztán emelni az adagot.

Figyelmeztetés

Cukorbeteg is alkalmazhatják (1 teáskanál 0,97 g szénhidrátot tartalmaz). Bélelzáródás, terhesség, szoptatás esetén ellenjavallt! Szívglükózidokkal való egyidejű alkalmazása esetén az esetlegesen kialakuló káliumhiány hatását befolyásolhatja. Túladagolása elektrolitvesztést okozhat (különös tekintettel a káliumra). A vizeletet enyhén vörösre festi.

Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 g.

Gyártja

Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.

Forgalmazza

Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-406/1993.

Heumann hólyag- és vesebántalmak elleni instant gyógytea (Solubirat® N)

Összetétel

Nyírfalevél, ortosiphonlevél és aranyvessző száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott édesköményolaj.

Felhasználási javaslat

A tea alkalmazható a vizeletkiválasztás növelésére (kímélő módszer), bakteriális fertőzések és különböző gyulladós megbetegedések (húgycső-, húgyhólyag-gyulladás, vesehomok) esetén a húgyutak átmosására. Csökkenti a gyulladásveszélyt, oldja a görcsös állapotot, enyhíti a panaszokat és elősegíti a gyógyulást.

Alkalmazás

Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port egy csésze (2 dl) forró vízben, az így elkészített teából, tetszés szerint ízesítve, naponta 3-5 csészenyi fogyasztása ajánlott. A kezelés sikere érdekében több mint 2 liter vizelet kiválasztása szükséges. Kúraszerű alkalmazása 6 hétig javasolt.

Figyelmeztetés

Csökkent szív- és veseműködés következtében kialakult ödéma esetén a nagy folyadékbevitellel járó atmosféri terápia miatt nem alkalmazható! Szív- és veseműködés zavarai esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 g.

Gyártja

Haumann Pharma GmbH -A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.

Forgalmazza

Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-412/1993.

Heumann köhögéscsillapító instant gyógytea (Solubifix N)

Összetétel

Zilizgyökér, édesgyökér és kankalinyökér száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott ánizsolaj és kakukkfűolaj.

Felhasználási javaslat

A tea köhögéscsillapító, köptető hatású, a felső légúti megbetegedések kezelésére alkalmazható. Javasolható dohányzás okozta köhögés csillapítására is. Cukorbeteg is alkalmazhatják (1 teáskanálnyi teapor 0,9 g szénhidrátot tartalmaz)!

Alkalmazás

Oldjunk fel 1 teáskanálnyi port egy csésze forróvízben, és az így elkészített teából naponta 3-6 csészével fogyaszthatunk.

Figyelmeztetés

Májbetegség, magas vérnyomás, alacsony vérkáliumszint, ánizsallergia esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig, felbontás után 6 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 g.

Gyártja

Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.

Forgalmazza

Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-412/1993.

Heumann máj- és epebántalmak elleni instant gyógytea (Solu-Hepar® NT)**Összetétel**

Boldolevél, vérehulló fecskefű és máriatövis száraz kivonata, valamint mikrokapszulázott borsosmentaolaj.

Felhasználási javaslat

A készítmény az epeutak megbetegedése esetén (amikor csökken az epe kiválasztása) és a toxikus anyagok, vegyszerek által megterhelt máj védelmére szolgál.

Alkalmazás

Oldjunk fel 1 teáskanálnyi teaport (1,2 g) egy csésze forróvízben. Az így elkészített tea fogyasztása tetszés szerint ízesítve naponta 3-5 alkalommal javasolt. Kúraszerűen legfeljebb 6 hétig alkalmazható.

Figyelmeztetés

1 teáskanálnyi por 0,9 g szénhidrátot tartalmaz! Súlyos májműködési zavarok, az epeutak elzáródása esetén ellenjavallt! Epékópanaszok és terhesség esetén alkalmazását meg kell beszélni a kezelőorvossal!

Felhasználható: 4 évig, felbontás után 6 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 g.

Gyártja

Heumann Pharma GmbH - A Searle Csoport tagja Heideloffstrasse 18-28, D-90478 Nürnberg, Németország.

Forgalmazza

Monsanto Kereskedelmi Kft. 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-440/1993.

Humet®-R szirup**Összetétel**

Huminsav, kálium, magnézium, vas, cink, mangán, réz, vanádium, kobalt, molibdén és szelén ízesített szirupban.

Felhasználási javaslat

A Humet®-R szirup alkalmazása általános roborálásra (betegség utáni lábadozás időszakában és időskorúaknál), nyomelemhiányos állapotok megszüntetésére, járványos időszakban a szervezet ellenálló képességének erősítésére, a betegségek megelőzésére, szellemi és fizikai teljesítőképesség fokozására, vashiány megelőzésére, vérvesztésnél (pl. menstruáció) a fokozott vasszükséglet pótlására ajánlott.

Alkalmazás

A jól felrázott szirupból naponta egy alkalommal, a főétkezés után felnőtteknek 10 ml, gyermekeknek (40 kg alatt) a felnőtt adag fele javasolt. A szirupot 1-2 dl vízben, gyümölcslében elkeverve kortyonként fogyasszuk.

Figyelmeztetés

Ha gyógykezelés alatt áll, a Humet®-R alkalmazását beszélje meg kezelőorvosával. A készítménnyel egyidejűleg alkalmazott egyéb gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket célszerű a Humet®-R szedése előtt vagy után 3 órával bevenni. Más makro- és mikro (nyom)elemeket tartalmazó készítményekkel együtt szedni nem ajánlatos. Diabéteszben figyelembe kell venni, hogy egy adag 3,3 g szénhidrátot tartalmaz. A székletet a készítmény sötétbarnára színezhetsz. A terhesség első harmadában és veseelégtelenség esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 1 évig, felbontás után 1 hónapig.

Kiszerezési egység: 120 és 300 ml.

Gyártja és forgalmazza

HORIZON-MULTIPLAN Rt. 1525 Budapest 114., Pf. 49.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-430/1993.

Hurutoldó teakeverék

Összetétel

Fehérmályva-level, fehérmályva-gyökér, édesgyökér, kamillavirág.

Felhasználási javaslat

A készítmény gyulladáscsökkentő és köptető hatású. A légutak felületén bevonatot képezve csökkenti a gyulladt nyálkahártya érzékenységet, enyhíti a köhögési ingeit. Elősegíti a hurutos megbetegedésekben felhalmozódott nyák elfolyósítását és megkönnyíti a felköhögését. Gyermekek is fogyaszthatják.

Alkalmazás

Öntsünk le 1 tetézet evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel és időnként kevergetve hagyjuk hűlni fél óráig, majd szűrjük le. Tetszés szerint ízesíthetjük. Kortyonként fogyasszunk a teából naponta 1-3 csészével.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-049/1988.

Ilja rogoff forte fokhagymadrzsé

Összetétel

Szárított fokhagymapor.

Felhasználási javaslat

Az időskori érrendszeri elváltozások megelőzésére, magas koleszterinszint esetén a diéta kiegészítésére ajánlott. A készítményt cukorbeteg is szedhetik. Az egy drzsében található kis mennyiségű szénhidrát (répacukor, tejcukor, szőlőcukor) 0,02 kenyérré számított szénhidráttegységnek (BE) felel meg.

Alkalmazás

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 3x2 drzsé, amit szétrágás nélkül, étkezés közben kell bevenni.

Figyelmeztetés

Alkalmazása során mellékhatásként gyomor-bélrendszeri zavarok, allergiás reakciók ritkán előfordulhatnak.

Bizonyos esetekben a fokhagymaszag a leheleten és a bőrön érezhetővé válhat.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 60 drzsé.

Gyártja

Rhône-Poulenc Rorer Nattermannallée 1., D-50829 Köln, Németország.

Forgalmazza

Rhône-Poulenc Rorer Hungaria Kft. 1012 Budapest, Pálya utca 9.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-479/1994.

Inno rheuma masszázsolaj

Összetétel

Mentol, rozmaryngolaj, levendulaolaj, lanalkol folyékony paraffinban.

Felhasználási javaslat

Különböző eredetű reumás bántalmak csökkentésére, az izom- és végtag- fájdalmak enyhítésére.

Alkalmazás

A fájdalmas testrészt az olajjal bekenjük, majd bemasszírozzuk. Naponta többször (legfeljebb ötször) célszerű alkalmazni.

Figyelmeztetés

A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni! A masszázsolaj szembe, nyílt sebbe, nyálkahártyára vérző testrésztre ne kerüljön! A készítmény bármely alkotórészeivel szembeni érzékenység (különösen mentol és a lanalkol) esetén használata ellenjavallt.

Felhasználható: 1,5 évig.

Kiszerezési egység: 180 ml.

Gyártja és Forgalmazza

NATURLAND Magyarország Kft.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-164/1990.

Inno rheuma tea

Összetétel

Rozmaringlevél, csalánlevél, zsurlófű, gyermekláncfű

Felhasználási javaslat

A teakeverék krónikus reumás bántalmak enyhítésére, az izomgörcsök, izomfájdalmak csökkentésére javasolt. A köszvényes, ízületi gyulladásos tüneteket is enyhíti

Alkalmazás

2 filtertasak teakeveréket 2,5 dl forrásban lévő vízbe tesszünk, 2-3 percig főzzük, és 5-10 percig állni hagyjuk. Tetszés szerint ízesítve reggel és este fogyasztandó.

Figyelmeztetés

Az összetevőkre érzékeny egyéneknél a tea alkalmazása során esetlegesen előforduló gyomorégés, székrekedés esetén a teakúra nem javasolt.

Felhasználható: 1,5 évig.

Kiszerezési egység: 25 filter.

Gyártja és Forgalmazza

NATURLAND Rt. Mosonmagyaróvár és Pásztó.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-285/1992.

Japán olaj

Összetétel

Japán és kínai eredetű mentaolaj.

Felhasználási javaslat

Eredményesen alkalmazható emésztési zavarok (telítettségérzet, gyomor-, illetve bélpanaszok) esetében, felső légúti megbetegedésekben (orr-, szájüreg-, garat-, légcső- és hörghurut esetén); valamint migrénes fejfájás ellen és rovarcsípésre bedörzsölőszerként.

Alkalmazás

Belsőleg az utasításnak megfelelően teába csepegtetve és inhalálásra alkalmazható, külsőleg bedörzsölőszerként.

Figyelmeztetés

Csak ép bőrfelületen használható! Vigyázzunk, hogy az olaj szembe ne kerüljön!

Májkárosodás, epeutak elzáródása, epehólyag-gyulladás és epekőveszély esetén nem alkalmazható!

Mentolra érzékeny egyének és három év alatti gyermekek számára nem ajánlott!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 10 ml, 30 ml, 100 ml.

Gyártja

Josef Bánó, Chem-pharm Präparate, A-6580 St. Anton, Ausztria.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-400/1993.

J'ol menty Japán gyógynövényolaj

Összetétel

A japán akamaru növény mentaolaja, alkoholos oldatban.

Felhasználási javaslat

Belsőleg:

Felső légutak meghűléses betegségei (köhögés, nátha; torokgyulladás, légcsőhurut) esetén ajánlott.

Külsőleg:

Kiegészítő kezelésként alkalmazható ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok ellen.

Alkalmazás

Belsőleg:

Naponta 1-2 alkalommal 1-2 cseppet egy pohár langyos vízben oldva, kortyonként igyunk meg. Inhaláláshoz: 1-2 cseppet tegyünk egy pohár forróvízbe, illetve 2-3 cseppet egy zsebkendőre, és a felszálló gőzöket lélegezzük be. Gyomor- és bélpanaszok, emésztési zavarok esetén és a puffadás megszüntetésére naponta 1x1-2 cseppet egy pohár gyümölcslevél, teával vagy vízzel vegyünk be. A napi adag 3x2 cseppig növelhető.

Külsőleg: Kiegészítő kezelésként alkalmazható ízületi- fájdalmak, reumatikus panaszok ellen. A fájó testrészeket naponta 3x5 cseppel dörzsöljük be. Utána melegítőpárnával vagy melegvizes palackkal tartjuk melegen. Forró borogatás készítéséhez 10-20 cseppet tegyünk a borogatóvízbe, majd a borogatást 10-20 percig hagyjuk a fájó testrészen. Fejfájás enyhítésére naponta többször 1-2 cseppet dörzsölünk el a halántékon, a homlokon vagy a tarkón.

Figyelmeztetés

Sérült bőrfelületen ne használjuk, és szembe ne kerüljön! Súlyos májkárosodás, epekövesség, az epeutak elzáródása és epehólyag-gyulladás esetén ellenjavallt!

Három éven aluli gyermekeknek ne alkalmazzuk!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 10 és 30 ml.

Gyártja

Woelm-Pharma GmbH, D-37269 Eschwege, Németország.

Forgalmazza

RIVAN Kft. 1121 Budapest, Törökbálinti út 3/b.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-388/1993.

Kalmil krém

Összetétel

Gyógynövényolajok (cickafarkfű, körömvirág) és alumíniumsók könnyen felszívódó krémekben.

Felhasználási javaslat

A készítmény a láb ödémaképződéssel járó vénás keringési problémáiban, valamint a kapilláriskárosodás (bőrfelszíni hajszálér) megelőzésére, illetve kezelésére ajánlott. Alkalmazható húzódással, zúzódással járó sérülésekre is. Primér és terhességi visszereesség esetén csökkenti a visszeres csomók fájdalmas feszülését és az éjszakai lábikragörcsöt, fokozza a kapillaris erek-összehúzóását, ezzel csökkenti az elszíneződést, enyhíti a láb túlterheltségéből eredő panaszokat és a fáradtságérzést.

Alkalmazás

Visszérbetegség esetén az egész lábat naponta 2-3 alkalommal, húzódás, zúzódás esetén a sérült részt naponta 3-4 alkalommal ajánlott a krémmel bekenni.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b.

Kapható

Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék Nagykereskedésben, 1077 Budapest, Rózsa utca 47.

Nyilvántartási szám: OGYI-371/1993.

Kilonit fogyasztó csepp

Összetétel

Tengeri alga, nyírfalevél, csalánlevél, csipkebogyó, kondurágókéreg és további öt gyógynövény alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A készítmény természetes módon segíti elő a lefogást, a túltápláltság okozta elhízás leküzdését. Csökkenti a kínzó éhségérzetet, ezáltal megkönnyíti a javasolt egyszerű és ésszerű diétás előírások betartását (napi háromszori étkezés, alkohol- és édességtilalom), fokozza a sejtek életműködését és az anyagcseréjük során keletkező salakanyagok kiürülését; csökkenti a zsírszövet által megkötött folyadékmennyiségét, a szervezet felesleges vízkészletét. Fokozza az alapanyagcserét, elősegíti a túlzott táplálékbevitel miatt lerakódott zsírpárnák lebontását.

Alkalmazás

Naponta 5x 10 csepp hígítatlan Kilo Nit bevétele ajánlott. Ebből 3x10 cseppet főétkezések után 1 órával, további kétszer 10 cseppet az étkezések között vagy este javasolt az éhségérzet felléptekor. Az adag fokozatosan napi 10x10 cseppig emelhető. Egy kúra átlagos időtartama 4 hét.

Figyelmeztetés

Tartós orvosi kezelés alatt állók a kúra megkezdése előtt kérjék ki kezelőorvosuk véleményét. A Kilo Nit szedése gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak, továbbá jóallergia esetén és pajzsmirigy-megbetegedésekben ellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 100 ml.

Gyártja

HEK PHARMA GmbH, Büro Hamburg, Selehopsweg 1. D-20061, Németország.

Forgalmazza

Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-198/1990.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Darpflege tableta**Összetétel**

Aloe, feketeteretek, kutyabengekéreg, szennalevél, lenmag és további 16 gyógynövény.

Felhasználási javaslat

Rendszeres szedése szabályozza és biztosítja az egészséges emésztést. Megszünteti a bélgörcsöket, elősegíti az emésztőnedvek képződését, ezáltal serkenti a bélműködést.

Alkalmazás

Szükség szerint, lefekvés előtt 1-3 tableta bevétele javasolt, bőséges folyadék kíséretében.

Figyelmeztetés

Bélelzáródás esetén, továbbá gyermekek, terhesek és szoptató anyák számára ellenjavallt! Állandó alkalmazása során a sóháztartás romlik (K+ veszteség lép fel)!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 60 vagy 120 tableta.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-127/1989.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener görcsoldó cseppek**Összetétel**

Libapimpó, fehér ürömfű, uzarae gyökér, édesköménytermés, köménytermés, kamillavirág, citromfű, cickafarkfű és macskagyökér alkoholos vizes kivonata.

Felhasználási javaslat

Gyomor, bél, epe és vesegörcs oldására, migrénes fejfájásra, menstruációs fájdalmak enyhítésére a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 3-6 alkalommal, illetve szükség esetén 10-30 csepp bevétele ajánlott kevés vízben vagy meleg tejben.

Figyelmeztetés

35-40% alkoholt tartalmaz! Gyermekek és alkoholelvonó kúrán átesettek számáraellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-267/1992.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Herzpflege szívcepppek**Összetétel**

Galagonya virágzó ágvége, macskagyökér, citromfű és aranyvesszőfű alkoholos vizes kivonata.

Felhasználási javaslat

Ideges szívpanaszok esetén, a szív táján jelentkező szorító, görcsös fájdalom ellen, úgynevezett ideges szívdobogás és az ehhez társuló nyugtalanság, szorongás megszüntetésére használatos készítmény. A gyógyszeres kezelés kiegészítésére is ajánlható. Németországban már hatvan éve alkalmazzák eredményesen.

Alkalmazás

Naponta 3-4 alkalommal 10-30 csepp ajánlott, kevés vízben elkeverve.

Figyelmeztetés

35-40% alkoholt tartalmaz! Alkoholelvonó kúra idején, epilepsziában, terhesség és szoptatás során ellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-266/1996.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Knoblin N tableta

Összetétel

14 gyógynövény (fehér fagyöngy, fokhagyma, babháj, nyirfalevél, galagonya virágos hajtása, gyermekláncfű, medveszőlőlevél, cickafarkfű, macskagyökér, máriatövis termése, katángkórógyökér, csipkebogyó, borókabogyó és mezei zsurlófű) porrá őrölve.

Felhasználási javaslat

Csökkenti a vérnyomást, segít megelőzni az érlemezsedést, javítja a vérkeringést, serkenti az emésztőnedvek működését, fokozza a szervezet ellenálló képességét, enyhe nyugtató hatású. Különösen ideges eredetű szívpanaszok és klimax esetén javasolt.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal étkezés előtt 1-3 tableta bevétele ajánlott.

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 120 tableta.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-332/1992.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Leber-und Gallenpflege tableta

Összetétel

Vérehulló fecskefű, kurkuma, apróbojtorjánfű, gyermekláncfű, retek, kutyabengekéreg, cikóriagyökér, benedekfű, köménymagtermés, zsályalevél, sóskaborbolya, cickafarkfű alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

Epekő és epehólyag bántalmak gyógyszeres kezelésének kiegészítésére, a máj és epeműködés fokozására szolgál.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 3-5 tableta szedése javasolt, étkezés után.

Figyelmeztetés:

Terheseknek, szoptató anyáknak és magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 100 tableta.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-265/1992.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Magenpflege tableta

Összetétel

Fehér ürömfű, ezerjófű, tárnicsgyökér, cickafarkfű és kömény porrá aprítva.

Felhasználási javaslat

Gyomorműködést serkentő, emésztést elősegítő készítmény.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-3 tableta bevétele ajánlott, kevés vízzel, étkezés után!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 60 tableta.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-494/1994.

Dr. Kleinschrod's Wörishofener Nervenpflege tableta

Összetétel

Galagonya, komló, fagyöngy, narancshéj, festőrekettye, orbáncfű, citromfű, cickafarkfű, macskagyökér, orvosi élesztő.

Felhasználási javaslat

Kedvezően alkalmazható ideges feszültség, nyugtalanság, álmatlanság esetén.

Alkalmazás

Célszerű kúraszerűen, 2-3 hétig folyamatosan szedni. Naponta 3 alkalommal 1-3 tableta. Elalvás megkönnyítésére lefekvés előtt 1/2 órával 3 tableta bevétele javasolt.

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 120 tableta.

Gyártja

DRONANIA GmbH, Karl-Benz Str. 3., D-8939 Bad Wörishofen, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-128/1989.

Klimin kapszula

Összetétel

Borágóolaj, csukamájolaj, nátrium-fluorid, mangán-klorid, króm-klorid; B3, B6 és E vitamin.

Felhasználási javaslat

Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott a klimax során fellépő panaszok megelőzésére és enyhítésére, a szervezet zsír és szénhidrát háztartásának karbantartására, az anyagcsere zavar következtében kialakult kóros állapotok (elhízás, szív- és érrendszeri elváltozások, cukorbetegség) megelőzésére, illetve mérséklésére.

Alkalmazás

Szükség esetén naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula étkezés utáni bevétele ajánlott.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 30 kapszula.

Gyártja

B Pharma Kutató és Fejlesztő BT. 1025 Budapest, Zuhany utca 2/b.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-380/1993.

Klimovit kapszula

Összetétel

Méhpepő, magnézium-aszparaginát, kukoricacsíra olaj, E vitamin.

Felhasználási javaslat

A Klimovit a klimaxos tünetegyüttes, tehát a petefészek csökkent illetve megszűnt működéséből eredő központi és perifériális panaszok hormon nélküli kezelésére szolgál.

Alkalmazás

Az első öt napon napi 2x1 kapszula bevétele ajánlott, a továbbiakban napi 1 kapszuláé. A kezelés javasolt időtartama 6 hét. A kúra a tünetek visszatérése esetén megismételhető.

Figyelmeztetés:

Pollenallergia, poliallergiáztság esetén a készítmény ellenjavallt! Virágpór-allergiára hajlamosak részére nem ajánlott!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 24 kapszula.

Gyártja

Gradiens Kft. 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 4.

Forgalmazza

Fahrvitex Kft. 1061 Budapest, Jókai tér 7. II./22.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-333/1992.

Klosterfrau Melisana koncentrátum

Összetétel

Citromfűlevél, örvénygyökér, angyalgökér, gyömbérgyökértörzs, szegfűszegvirág, galangagyökér, fekete bors, tárnicgyökér, narancshéj, szerecsendió, fahéjkéreg, szennavirág, kardamomtermés illóolaját tartalmazza alkoholos desztillátumban.

Felhasználási javaslat

Feszült, izgatott állapot, lámpaláz, el- és átalvási zavarok, ideges eredetű fejfájások, időjárás iránti érzékenység, szervi ok nélküli szív- és emésztőrendszeri panaszok, menstruációs és változáskori rendellenességek esetén alkalmazható. Megelőző és kiegészítő kezelésként meghűléses és influenzás fertőzésekben is ajánlott. Külsőleg ideg- és izomfájdalmak kezelésére használható.

Alkalmazás

Belsőleg:

Szokásos adagja 1-3 kávéskanálnyi, amit legalább kétszeres mennyiségű folyadékkal (víz, tea, gyümölcslé) hígítva vagy kockacukorra csepegtetve ajánlott bevenni.

Külsőleg:

Hígítatlanul, vagy érzékeny bőrűek esetén 2 rész vízzel hígítva kell alkalmazni.

Figyelmeztetés

A készítmény 66% alkoholt tartalmaz! Májbetegség, epilepsziások, agykárosultak, terhesek, gyermekek, magasban dolgozók, gépjárművezetők nem szedhetik!

Gyomor és nyombélfekély esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 95 ml, 155 ml.

Gyártja

MCM Klosterfrau, D-50606 Köln, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-415/1993.

Kobralgin krém

Összetétel

Indiai kobrakígyóméreg kivonat és árnikatinktúra.

Felhasználási javaslat

A Kobralgin krém a megerőltetés, húzódás okozta izomfájdalmak gyors, hatásos csökkentésére; ideg és ínhüvelygyulladások esetében a fájdalom csökkentésére, valamint a gyulladásos folyamat gyógyulásának elősegítésére, a reumatikus bántalmak okozta fájdalmak enyhítésére, fizioterápiás kezelés előtt és alatt a fájdalmas, merev ízületek "bemozgatásának" elősegítésére alkalmazható. Sportolók "bemelegítő krémként" is használhatják.

Alkalmazás

Kenjük a krémet a fájdalmas testrészre, ízületre kb. 1 mm vastagon és óvatos mozdulatokkal dörzsöljük a bőrbe. Erős fájdalmak esetén a kezelést naponta több (5-6) alkalommal ismételjük meg, esetenként pakolás formájában.

Figyelmeztetés

Valamely ható vagy segédanyaggal szembeni egyéni túlérzékenység esetén ellenjavallt! Sérült, bőrhiányos területre ne kenjük! Használat után gondosan mossunk kezet!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő utca 101.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-283/1992.

Kovitox izomlazító hatású krém

Összetétel

Kobra, vipera és csörgőkígyóméreg vízzel lemosható kenőcsben.

Felhasználási javaslat

A készítmény a reumatikus, ízületi megbetegedésekre jellemző bemerevedett izmok, ízületek görcsös állapotának oldására alkalmazható, valamint a sportolás közben vagy nehéz fizikai munka esetén a fokozott

terhelés hatására kialakuló izomgörcsök megelőzésére, illetve az ezeket kísérő izomsérülések kezelésére. Sportolóknak bemelegítő krémként és húzódások kezelésére is ajánlott.

Alkalmazás

A krémet kenjük 1-2 mm vastagságban a kezelendő testfelületre és dörzsöljük a bőrbe. A Kovitox krém nem zsíros jellegű, egy-két perc alatt jól felszívódik.

A sportolók bemelegítés céljára, nagyobb testfelületre is kenhetik.

Figyelmeztetés

Ügyeljünk arra, hogy a készítmény bőrhiányos területre, sérült bőrfelületre, szembe ne kerüljön! Használat után gondosan mossunk kezet! Árnikavirág-érzékeny egyéneknek használata ellenjavallt!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 60 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-306/1992.

Köptető teakeverék

Összetétel

Bodzavirág, édesgyökér, hársfavirág, fehérmályva levél, kakukkfű, fehérmályva gyökér, édesköménymag.

Felhasználási javaslat:

A készítmény feloldja a légutakban lerakódott nyákot, köptető hatású. Gátolja az irritáció következtében kialakuló köhögési ingert, a kínzó görcsös köhögést. Megakadályozza a kórokozók megtelepedését és szaporodását. Akut és krónikus hörghurut esetén is alkalmazható. Dohányosok esetében az évente 2-3 alkalommal végzett 2 hetes kúra elősegíti a lerakódott anyagok kiürülését.

Alkalmazás:

Öntsünk le 1 tetézet evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel és időnként kevergetve hagyjuk fél óráig hűlni, majd szűrjük le. Az így elkészített teát, tetszés szerint ízesítve, naponta 3-4 alkalommal fogyasszuk. A teakeverék kúraszerűen is fogyasztható.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-081/1988.

Kukoricacsíra olaj kapszula

Összetétel

Kukoricacsíra olaj.

Felhasználási javaslat

Hosszan tartó alkalmazása lassítja a szervezet érlemeszesedési folyamatait, csökkenti a megemelkedett vérzsírszintet, ezért csökkenti a trombózis és a szívinfarktus kialakulásának valószínűségét. Szedése terhesség idején is ajánlott.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 100 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-171/1990.

Kwai fokhagymadrazsé

Összetétel

Szárított fokhagymapor (min. 1,3% Alliin, ami megfelel 0,6% Allicinnek).

Felhasználási javaslat

Alkalmazása a szív és a vérkeringés erősítésére, továbbá érlemeszesedés ellen ajánlott. Cukorbeteg is szedhetik. A fokhagyma vitalizáló és egészségmegőrző hatása régóta ismert. E készítmény emellett csökkenti a megnövekedett vérzsírtartalmat és a túl magas vérnyomást, és ezáltal hozzájárul az érlemeszesedés

megelőzéséhez. Enyhíti a már meglévő, érlemeszesedés által okozott panaszokat (fejfájás, szédülés, fülzúgás), javítja a végtagok vérkeringését, így csökkenti azok bizsergését és hidegérzetét. Folyamatos alkalmazása kb. a 40. életévtől javasolt.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 draszté bevétele ajánlott kevés folyadékkal, étkezés előtt. Az adag szükség esetén a duplájára emelhető.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 100 draszté.

Gyártja

Lichtwehr Pharma GmbH, Wallenroder Str. 8-10. D-13435 Berlin, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-260/1991.

Laktoherb tejelválasztást serkentő teakeverék

Összetétel

Ánizstermés, citromfű, édeskömény és köménytermés, csipkebogyó.

Felhasználási javaslat

A teakeverék az alkotórészek komplex hatása következtében fokozza az anyatej termelését.

Alkalmazás

Öntsünk le 1 filtert 2,5 dl forrásban lévő vízzel, és az így elkészített teát tetszés szerint ízesítve, hidegen- vagy melegen fogyasszuk.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 25 filter.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-571/1995.

Laxen hashajtó lekvár

Összetétel

Bodzavirág, édesköménytermés, koriandertermés, édesgyökér vizes kivonata és Seignette-só szilvalekvárban.

Felhasználási javaslat

A készítmény standardizált hatóanyagai, a szennozid A és B, serkentik a bélmozgást. A bodzavirág glikozidjai enyhe hashajtó és vízajtó tulajdonságúak. Az édeskömény és a koriander illóolajai egyfelől a bélmozgásokat optimalizálják, másfelől görcsoldó hatásúak. E komplex hatások eredményeként a készítmény jól alkalmazható különböző eredetű székrekedések kezelésére.

Alkalmazás

Gyermekeknek 3-6 éves korig 1-2 mokkáskanálnyi, 6-12 éves korig 1 kávéskanálnyi bevétele ajánlott, este, lefekvés előtt. Felnőtteknek, egyéni érzékenységtől függően, este 1-2 kávéskanálnyi.

Figyelmeztetés

Bélelzáródás esetén, terhesség és szoptatás idején és 3 éven aluli gyermekek számára ellenjavallt! Túladagolása erős alhasi vérbőséget és kólikás fájdalmat okozhat!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 150 g.

Gyártja és Forgalmazza

PARMPA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben, valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a).

Nyilvántartási szám: OGYI-121/1989.

Lecitin Richter elixír

Összetétel

Lecitin.

Felhasználási javaslat

A készítmény alkalmazása ideges kimerültség, fokozott fizikai és szellemi megterhelés idején, betegség utáni lábadozás időszakában, járványos időkben a szervezet általános ellenálló képességének fokozására, a legyengült szervezet felerősítésére, továbbá az érlemeszesedés kialakulásának megelőzésére, illetve kezdeti szakaszában a folyamat lassítására ajánlott.

Alkalmazás

Adagja naponta 3x1 evőkanál étkezések után. A szokásos kúra 3-4 hét, amely szükség szerint megismételhető.

Figyelmeztetés

A készítmény 15% alkoholt tartalmaz. Cukorbetegség és gyermekek számára fogyasztása ellenjavallt!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 250 ml.

Gyártja és forgalmazza

Richter Gedeon Rt. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-116/1989.

Liosept szemborogató

Összetétel

Kamilla, útifű és búzavirág tisztított, liofilizált kivonata.

Felhasználási javaslat

A kamilla hatóanyagainak gyulladáscsökkentő hatását a legújabb kutatási eredmények is megerősítették. E hatást fokozzák az útifű hatóanyagai (aukubin, polifenol stb.) baktériumölő, sebgyógyító tulajdonságaik révén. A búzavirág csersavtartalma összehúzó hatást fejt ki. A Liosept szemborogató eredményesen alkalmazható enyhe kötőhártya gyulladásnál a gyulladás, váladékozás csökkentésére, kisebb szemhéji sérüléseknél, kezdődő vagy már kialakult árpa borogatására, vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítésére, kozmetikai szerek által okozott enyhébb szemészeti panaszok csökkentésére. A készítmény hatása orvosilag igazolt.

Alkalmazás

Egy üveget kiforralt és testhőmérsékletűre hűtött vízzel feltöltünk, és tartalmát rázogatva feloldjuk. A szokásos módon szemborogatóra, lemosásra használjuk.

Felhasználható: 2 évig, feloldás után, hűtőszekrényben tárolva, legfeljebb egy napig.

Kiszerelési egység: 3 ampulla.

Gyártja és forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-456/1994.

Lysosym tableta

Összetétel

Természetes eredetű standardizált lysosym.

Felhasználási javaslat

A Lysosym mikroorganizmusok által okozott szájfertőzések megelőzésére és kezelésére szolgál. Mindenféle bakteriális eredetű nyelőcső, gégefő, torokgyulladás, szájfertőzés, szájüregsérülés, gége, mandula és fogműtétet követő szájfertőzés elhárítására, illetve megelőzésére, a fertőzések helyi leküzdésére, illetve az ilyen fertőzések kialakulásának megelőzésére alkalmazható.

Alkalmazás

A készítményből naponta 3x1 tablettát kell elszopogatni lassan, szétrágás nélkül. A tableta szopogatása közben és utána 10-15 percre ne fogyasszunk se ételt, se folyadékot. Ennyi idő szükséges az antibakteriális hatás kifejtéséhez. A készítményt cukorbetegség is fogyaszthatják.

Figyelmeztetés: Tojásfehérje allergia esetén nem alkalmazható!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 20 tableta.

Gyártja és forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-410/1993.

Martol kapszula

Összetétel

Mate-level kivonat.

Felhasználási javaslat

Szellemi és fizikai teljesítmény csökkenése, illetve kimerültség esetén alkalmazható készítmény, melynek hatását népgyógyászati adatok igazolják.

Alkalmazás

Naponta 4 kapszula bevétele ajánlott bőséges folyadék fogyasztása mellett. A napi elosztás: reggel 1, délben 2, este 1 kapszula fél órával az étkezés előtt.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 kapszula.

Gyártja

Wölfer GmbH 2371 Bovenau Klüvensiek HEK Pharma GmbH Sellhopsweg 1. D-20061, Németország.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-511/1995.

Maurers Schweden Bitter 32 gyógynövényből**Összetétel**

Sáfrány, mirrha, manna, bábakalácsgyökér, angyalgyökér, kámfor, citvoryökér, thériák, szegfűszeg, babértermés, szegfűborsternés, narancshéj, citromhéj, rozmaringlevél, benedekfű, majoranna, csillagánizs termés, köménytermés, boróka tobozbogyó, gyömbérgyökértörzs, koriandertermés, kínaigyömbér gyökértörzs, ánizsternés, ezerjófű, kamillavirág, tárnicsgyökér, fehér ürömfő, nyárfarügy, kanellakéreg, vörös kínakéreg, kardamómtermés, nószirrom gyökértörzs.

Felhasználási javaslat

Belsőleg:

Általános erősítőszerként regenerálja a szervezetet, fokozza az ellenálló képességet. Használható különféle eredetű gyomor és epepanaszok, emésztési rendellenességek kezelésére.

Külsőleg: reumás panaszok és végtagfájdalmak enyhítésére, bedörzsöléssel és borogatás formájában.

Rovarcsípés esetén borogatás formájában használható.

Alkalmazás

Belsőleg naponta 2x1 evőkanálnyi bevétele ajánlott.

Figyelmeztetés

A készítmény 43% alkoholt tartalmaz! Májbetegék és alkohollal interakciót adó gyógyszert szedők számára fogyasztása nem javasolt! Cukrot és hashajtó anyagot nem tartalmaz!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 0,1 l, 0,5 l, 0,35l.

Gyártja

Sebastian Stroh GmbH.

Forgalmazza

K&B Üzletház Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 16/b

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-496/1995.

"Mecsek" diétás tea**Összetétel**

Babhüvely, diófalevél, gyermekláncfűgyökér, tarackbúzagyökértörzs, kukoricabajusz, borsosmentalevél, borókabogyó, kutyabengékéreg.

Felhasználási javaslat

Cukorbetegségekre való hajlam esetén az étrend szabályozásával elérhető egyensúlyi állapot elősegítésére alkalmazható.

Alkalmazás

Cukor nélkül vagy mesterséges édesítőszerrel ízesítve fogyasztható. Tegyük egy csészényi (2 dl) forró vízbe 1 csapott evőkanálnyi teakeveréket, hagyjuk 2-3 percig állni, majd szűrjük le. Az így elkészített teából langyosan fogyasszunk napi 1-3 alkalommal 1 csészényit.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-001/1986.

"Mecsek" reumakezelést kiegészítő tea

Összetétel

Fűzfakéreg, bodzavirág, nyírfalevél, aranyvesszőfü.

Felhasználási javaslat

A teakeverék reumás megbetegedések esetén a gyógyszeres terápiával egyidejűleg is alkalmazható gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmény. Enyhe vízajtó hatása igen kedvező az antireumatikus terápia kiegészítéséhez.

Alkalmazás:

Öntsünk le 1 tetézt evőkanálnyi teakeveréket egy csészényi (2 dl) forró vízzel, és időnként kevergetve hagyjuk állni 10-15 percig, majd szűrjük le. Az így elkészített tea naponta 2-3 alkalommal 1 csészényi, tetszés szerint ízesítve, langyosan fogyasztható.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 3.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-007/1986.

Medhirud krém

Összetétel

Orvosi piócából speciális eljárással előállított kivonat és árnikakivonat vizes gél alapú krémekben.

Felhasználási javaslat:

A Medhirud krém háztartási balesetek, rándulások, ütődések esetén a keletkező duzzanatok, vérömlenyek kezelésére, az érzékeny bőrű egyéneknél gyakran jelentkező hajszáleres bevérzések felszívódásának elősegítésére, illetve visszérbetegségben alkalmazható.

Alkalmazás:

Kenjük a krémet szükség szerint naponta 2-5 alkalommal a kezelendő testrésze (gyulladt visszér, ütődés vagy rándulás következtében keletkezett duzzanat, vérömleny stb.) 1 mm vastagságban, és óvatosan simítsuk a bőrbe. Súlyosabb esetekben alkalmazzuk pakolásként. A pakolást célszerű minimum 30 percig a kezelendő testrészen hagyni. Visszérbetegség esetén a kezelés megkezdése után lábunkat 20-30 percre polcoljuk fel.

Figyelmeztetés:

A krémet nyílt, vérző sebre ne kenjük! Használata során az erős, tűző napfényt kerüljük!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 60 g.

Gyártja és Forgalmazza

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-303/1992.

Melliora krém

Összetétel

Méhméregkivonat, árnikatinktúra és kámfor vízzel lemosható kenőcsben.

Felhasználási javaslat

A készítmény főleg ízületi gyulladások, reumatikus izom- és ízületi bántalmak esetén alkalmazható eredményesen a fájdalmak csillapítására.

Alkalmazás

A krémet a fájdalmas testrésze, ízületre és annak környékére kell felkenni, majd a bőrbe dörzsölni. A fájdalom erőssége szerint a kezelés naponta többször is megismételhető. A készítmény hatóanyaga jobban felszívódik, ha a krémet pakolásként alkalmazzuk.

Figyelmeztetés

Nyílt sebre, hámsérüléssel felületre, nyálkahártyára nem alkalmazható! Méhméreg-allergia, bőrbetegségek esetén ellenjavallt! Használata után gondosan mossunk kezet! Ritkán allergiás bőrreakciót (bőrpír, viszketés, duzzanat) okozhat.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-238/1991.

Memolife kapszula

Összetétel

Standardizált összetételű tengerihalolaj (18% EPA, 12% DHA), borágóolaj (20% GLA), szójalecitin, valamint béta-karotin.

Felhasználási javaslat

Felnőtt és idős emberek memóriájának és koncentrációs képességének serkentésére, illetve szellemi frissességének megőrzésére, gyermekek és serdülők értelmi fejlődésének megőrzésére, a dementia (az emlékezőképesség tartós hanyatlása, csökkenése) valamilyen formájában vagy az Alzheimer betegségben szenvedők gyógyszeres kezelésének kiegészítésére alkalmazható.

Alkalmazás

A memória és a koncentrációs készség fenntartására naponta 2 kapszula bevétel ajánlott, reggel, bő folyadékkal, memóriaromlás esetén, emlékezési zavarokban és különböző dementia formákban naponta 2x2 kapszula, reggel és este, bő folyadékkal.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 24 kapszula.

Gyártja

B Pharma Kutató és Fejlesztési Bt. 1024 Budapest, Zuhany utca 2/b.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-438/1993.

Menofit csepp

Összetétel

Citromfű, cickafarkfű, tarackbúzagyökér, koriandertermés és indiai tealevél kivonata.

Felhasználási javaslat

A termék összetevőit a népgyógyászat régóta használja a menstruációs tünetegyüttes egyes panaszainak kezelésére. A menstruációs időszak kellemetlen tünetei: a görcsök, pszichés labilitás, hányinger, fejfájás a készítmény alkalmazásával enyhülnek.

Alkalmazás

3-5 nappal a menstruáció kezdete előtt és a menstruáció ideje alatt naponta 3x30 csepp bevétel ajánlott, étkezés után, folyadék kíséretében.

Figyelmeztetés

Koffeintartalma miatt a napi utolsó adagot legkésőbb a délutáni órákban ajánlatos elfogyasztani. Célszerű vele együtt B6-vitamint is szedni. Magas vérnyomás esetén szedése nem javasolt! 35-40% alkoholt tartalmaz. A Menofit csepp alkalmazása idején az alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerek (nyugtatók) szedése kerülendő!

Felhasználható: 18 hónapig, a felbontástól számítva 1 hónapig.

Kiszerelési egység: 30 ml.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-256/1991.

Menthacol epecsepp

Összetétel

Mentol és borsosmentaolaj propilénglikolban.

Felhasználási javaslat

Anyagait már a népgyógyászatban is sikerrel alkalmazták az epebetegségek gyógykezelésére. Hatóanyagai az emésztőtraktuson keresztül szívódnak fel. Az epével kiválasztott mentol fokozza az epetermelést, elősegíti az epehólyag és az epeutak kiürítését, gátolja az epekőképződést. Használatával megelőzhető vagy megszüntethető az elégtelen epeürítésből eredő epegörcsök. Elégtelen epeműködés miatt hirtelen beálló epehólyagtáji görcsös fájdalom vagy az étkezés után jelentkező haspuffadás, teltségérzés, keserű szájíz megszüntetésére, illetve megelőzésére használható.

Alkalmazás

Az epeműködéssel összefüggő emésztési zavarok kedvező befolyásolására, megelőzésére kúraszerű alkalmazása javasolt 8-10 napig, naponta 3-4 alkalommal, 3-4 cseppet kockacukorra csepegtetve és étkezés után elfogyasztva.

Figyelmeztetés

A készítménynek a már kialakult epekőre oldó hatása nincs, csak a görcsös tüneteket szünteti meg. Használatával a szükségessé váló műtét nem kerülhető el! A készítmény alkalmazását a kezelőorvossal mindig egyeztetni kell. Hét éven aluli gyermeknek nem adható!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 10 ml.

Gyártja és forgalmazza:

Dr. Frank Kft. 2011 Budakalász, József Attila utca 48/a.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-083/1988.

Migrenium® kapszula**Összetétel**

Ószimargitvirág-kivonat.

Felhasználási javaslat

Angliában végzett kísérletek eredményei azt mutatták, hogy ha megelőzés céljából őszi margitvirág kezelést alkalmaznak, nem alakultak ki migrénes rohamok még azokban az esetekben sem, amikor a hagyományos gyógyszerekre a beteg nem reagált. A hazai vizsgálati eredmények is alátámasztják, hogy az őszi margitvirág speciális kivonata fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. Alkalmazható a migrén megelőző kezelésére, a migrénes tünetek enyhítésére, a migrén típusú fejfájás vagy ideges fejfájás (premenstruációs és menstruáció alatti fejfájás) csillapítására és egyéb fejfájásos panaszok esetén.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 30 kapszula.

Gyártja és forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-433/1993.

Mirex granulátum (narancs és diabetikus ízesítésű)**Összetétel**

Búzakorpából készült protekarpin.

Felhasználási javaslat

A készítmény alkalmazása különösen ajánlott különböző hurutos gyomor és bélbetegségekben, illetve az ezekre való hajlam esetén a megelőzésben, gyomor és nyombélfekély esetén a gyógyszeres terápia kiegészítésére, a gyomrot irritáló gyógyszerek (gyulladásgátlók, reumaellenes szerek) szedésekor a mellékhatások kivédésére, mérséklésére, puffadással vagy anélkül előforduló renyhe bélműködés, székrekedésre való hajlam esetén a bélműködés fokozására, aranyérbetegség esetén kiegészítő kezelésre.

Alkalmazás

Felnőtteknek kúraszerű alkalmazásban javasolt. Naponta egyszer 1-2 kávéskanálnyi (3-6 g) granulátumot oldjunk fel 1-2 dl folyadékban (tej, víz, gyümölcsle), és reggeli előtt éhgyomorral igyuk meg. Gyermekek - 10 kg testsúly alatt - a felnőtt adagok felét fogyaszthatják.

Figyelmeztetés

A Mirex cukrot tartalmaz, cukorbeteg csak a diabetikus változatot fogyaszthatják!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 75 g.

Gyártja és forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-592/1996.

Multicomp tableta**Összetétel**

Vas, mangán, cink, réz és magnézium természetes poligalakturon-savhoz kötötten.

Felhasználási javaslat

Eredményesen alkalmazható a szervezet ellenálló képességének, szellemi és fizikai teljesítményének növelésére, fáradékonyság és elesettség megelőzésére, megszüntetésére, általában a nyomelemhiányos

állapotok megszüntetésére, az élettani folyamatok optimális egyensúlyának fenntartására. (A szervezet felépítéséhez szükséges nyomelemek hiánya a szervezetben működési elégtelenséget, többnyire felszívódási vagy szabályozási zavarokat okoz.)

Alkalmazás

Felnőtteknek naponta 1 tabletta, fokozott szellemi, illetve fizikai igénybevétel esetén napi 2x1 tabletta bevétele javasolt étkezés után, szétrágás nélkül. A jobb felszívódás érdekében a tabletták bevitelével egy időben 100-100 mg C-vitamin vagy 1-1 Polivitaplex 8 draszté bevétele ajánlott.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 20 tabletta.

Gyártja és Forgalmazza:

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható:

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-219/1991.

Osmin granulátum

Összetétel

Kalcium és foszforsó, vas, réz, cink, molibdén és mangán.

Felhasználási javaslat

A készítmény a csontképzés szempontjából optimális arányban tartalmaz kalciumot és foszfort, így alkalmas csonttritkulás (osteoporosis) és más eredetű kalciumhiányos állapotok megelőzésére. Allergiás eredetű betegségek (csalánkiütés, szénanátha) kiegészítő kezelésére is ajánlott:

Alkalmazás

Oldjunk fel (naponta 2 alkalommal) 1 púpozott teáskanálnyi granulátumot kb. 1/2-1 dl vízben, és igyuk meg. Az osteoporosis megelőzésére kúraszerű szedése ajánlott, amit kellemes íze elősegít.

Figyelmeztetés

Súlyos szív és vesebetegség esetén alkalmazása előtt ki kell kérni a kezelőorvos véleményét! A tetraciklinek (pl. Tetran, Doxycyclin) felszívódását csökkenti, ezért csak azok bevétele után 3 óra elteltével fogyasszuk.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 280 g.

Gyártja és Forgalmazza:

dr. Frank Kft. 2011 Budakalász, József Attila utca 48/a.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-353/1992.

Peponen kapszula

Összetétel

Héj nélküli tökmagolaj.

Felhasználási javaslat

Csökkenti a prosztatata (dülmirigy) jóindulatú megnagyobbodását kísérő tüneteket (pl. fájdalmas vizeletürítés, éjszakai vizelek gyakorisága). Jó hatásúnak bizonyul (enyhíti a tüneteket) különféle idült bőrgyulladásos folyamatok kiegészítő kezelésében. Hosszan tartó fogyasztása lassítja a szervezetben az érlemesedés folyamatát. Előnyösen befolyásolhatja az agyi keringés normális állapotának fenntartását.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele javasolt.

Figyelmeztetés

Ritkán, hosszan tartó kezelés során laza széklet, hasmenés előfordulhat.

Felhasználható: 2 évig

Kiszerelési egység: 100 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-082/1988.

Plerico visszérkrém

Összetétel

Körömvirág kivonat vízzel lemosható kenőcsben.

Felhasználási javaslat

Alkalmas egyrészt a vénás pangások, visszeres bántalmak kiegészítő terápiájára, másrészt a bőr különböző eredetű hámsérüléseinek, és nehezen gyógyuló sebek, berepedezések kezelésére. Kiváló gyulladáscsökkentő,

fájdalomcsillapító és a bőr vérellátását fokozó hatása a körömvirág magas karotinoid és flavonoid tartalmának köszönhető.

Alkalmazás

A krémet naponta 2-3 alkalommal kenjük a fájdalmas, duzzadt területre, és finoman simítsuk a bőrbe. Pakolásként is alkalmazható. Ilyenkor 1-2 mm vastagon kenjük fel, majd nedves gézzel lazán kössük át. A lábakat felpolcolva pihentessük.

Figyelmeztetés

Nyílt, vérző sebfelületen történő alkalmazása ellenjavallt

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-227/1991.

Plerudin visszérkrém

Összetétel

Körömvirág zsíros, olajos kivonata és orvosi pióca kivonata (125 antithrombin egység) vízzel lemosható emulziós krémekben.

Felhasználási javaslat

A Plerudin visszérkrém önálló terápiaként vagy a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazható, a súlyosabb, elhanyagolt állapotú visszeres bántalmak kezelésére, a duzzadt, gyulladt visszerek görcsös fájdalmának csökkentésére (rendszeres használata esetén a pangó visszeres csomók felszívódnak, a gyulladással állapot megelőzhető), a rándulások, ütődések, ficamok során keletkező vérömlenyek, ödémák felszívódásának elősegítésére.

Alkalmazás:

Kenjük a krémet naponta 2-3 alkalommal a fájdalmas, duzzadt területre és egyenletesen dörzsöljük a bőrbe. Pakolásként az érintett területet 1-2 mm vastagon fedjük be a krémmel, majd borítsuk be nedves gézzel és műanyag fóliával. Az alsó végtagokat felpolcolva pihentessük, lehetőleg naponta legkevesebb 20-30 percre. Ha van lehetőség, a pakolást (különösen a visszérbetegség előrehaladottabb állapotában) naponta két alkalommal ismételjük meg.

Figyelmeztetés

Nyílt, vérző sebre kenni tilos! A hatóanyag elleni túlérzékenység esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-234/1991.

Primal köptető granulátum

Összetétel

Kankalintinktúra, zilizgyökér alkoholos vizes kivonata, méz.

Felhasználási javaslat

Általános köhögéscsillapító, köptető készítmény. Felső légúti megbetegedésekben elősegíti a felhalmozódott váladék kiürítését. A zilizgyökér hatóanyaga vékony rétegben bevonatot képez így védi a nyálkahártyát az izgató anyagoktól. A méz jótékony hatása a légutakra régóta ismert.

Alkalmazás

1-3 éves korban 3x1 mokkáskanálnyi, 3-6 éves korban 2x1 kávéskanálnyi, 6-12 éves korban 3x1 kávéskanálnyi, 12 év felett 2x1 evőkanálnyi granulátumot oldjunk fel 1-2 dl vízben, majd itassuk, illetve igyuk meg.

Figyelmeztetés

Virágpor érzékenység esetén ellenjavallt! Túladagolásakor hányás előfordulhat.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 70 g.

Gyártja és Forgalmazza

PARMA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a.

Kapható:

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben; valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a).

Nyilvántartási szám: OGYI-140/1990.

Propur csepp**Összetétel**

Propolisz kivonat 85%-os alkoholban.

Felhasználási javaslat

A propolisz gyulladáscsökkentő, a szervezet védekezőképességét erősítő, antibakteriális, az antibiotikumok hatását fokozó anyag, amely helyi érzéstelenítő hatással is rendelkezik.

A propoliszt tartalmazó Propur csepp felső légúti megbetegedésekben, szájüregi és torokgyulladások megelőzésére, a gyomor, bél és húgy ivarrendszerben fellépő gyulladások mérséklésére alkalmazható. Általános erősítő, élénkítő hatással is rendelkezik.

Alkalmazás

Alkalmazása esetén 3x20 csepp bevétele ajánlott cukorra vagy kenyérrre csepegtetve.

Figyelmeztetés

Virágporra érzékeny egyéneknél allergiás (ödéma, szájnyálkahártya vörösödés) reakciót válthat ki! Vese- és cukorbetegnek csak a kezelőorvos javaslatával szedhetik.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Finomvegszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út 160.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-606/1996.

Propur kenőcs**Összetétel**

Propoliszkoncentrátum zsíros krémalapanyagban.

Felhasználási javaslat

A propolisz gyulladáscsökkentő, antibakteriális, enyhe helyi érzéstelenítő hatású. A propoliszt tartalmazó Propur kenőcs jótékony hatása a bőrre, a sérült, merev izmokra és ízületekre. Mérsékli a rándulás, a ficam, a reumás folyamatokhoz társuló fájalmakat. Sportsérülések esetén jelentősen lerövidíti a gyógyulási időt.

Alkalmazás

Naponta 2-3 alkalommal dörzsöljük a bőrbe a fájó területen.

Figyelmeztetés

A készítmény csak külsőleg alkalmazható! A textílián, bőrön foltot hagy, amely alkohollal eltávolítható. Ha az első alkalmazás során a bőrön bőrpír jelentkezik, ne használjuk tovább a készítményt!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

Finomvegszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út. 160.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-605/1996.

Propur tableta**Összetétel**

Propoliszkivonat, aszkorbinsav.

Felhasználási javaslat

Általános erősítő, élénkítő hatása mellett önállóan vagy egyéb gyógyszeres terápia kiegészítőjeként eredményesen alkalmazható például enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti megbetegedések, szájüregi és torokgyulladások megelőzésére, a gyomor, bél és húgy-ivarrrendszerben fellépő gyulladások mérséklésére.

Alkalmazás

Naponta 3x1-3 tableta elszopogatása javasolt.

Figyelmeztetés

Enyhe gyomorpanaszokat (gyomorégés, telítettségérzés) okozhat. Vese és cukorbetegnek csak a kezelőorvos tudtával szedhetik. A propoliszérzékeny egyéneken allergiás reakciókat válthat ki (erythema, ödéma). Ismert pollenallergia esetén alkalmazása fokozott óvatosságot igényel!

Felhasználható: 24 hónapig.

Kiszerelési egység: 10 tableta.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-010/1986.

Propur tinktúra

Összetétel

Propolisz és etanol.

Felhasználási javaslat

A propolisz gyulladáscsökkentő, a szervezet védekezőképességét erősítő, antibakteriális, az antibiotikumok hatását fokozó anyag, amely helyi érzéstelenítő hatással is rendelkezik. A propoliszt tartalmazó Propur tinktúra, fertőtlenítő, sebgyógyulást elősegítő hatása révén alkalmazható bőrgyulladások, sérülések, pattanások, kis fokú égések és rovarcsípés esetén.

Alkalmazás

Alkalmazása során naponta 2-3 alkalommal juttassunk 20 cseppet vattára cseppentve a kezelendő bőrfelületre.

Figyelmeztetés

A tinktúra virágporra érzékeny egyéneknél allergiás tüneteket válthat ki! Ha az első alkalmazás során a bőrön pirosodás jelentkezik, a kezelést hagyjuk abba. A termék a textílián és a bőrön foltot hagy, amely alkohollal eltávolítható. A készítmény csak külsőleg alkalmazható!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Finomvegyszer Szövetkezet, 1116 Budapest, Fehérvári út 160.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-604/1996.

Prostagalen® N cseppek

Összetétel

Törpepálmamag, amerikai csodamogyoró kérge, csalángyökér és tövises iglicegyökér alkoholos vizes kivonata.

Felhasználási javaslat

Prostatamegnagyobbodás esetén, prosztataműtétek elő és utókezelésében a gyógyszeres terápia kiegészítésére alkalmazható. Tartalmi anyagai görcsoldó, gyulladáscsökkentő és vizeletkiválasztást elősegítő hatásúak.

Alkalmazás

Naponta 3-szor 10-15 csepp vagy 2-szer 20-25 csepp bevétele ajánlott kevés vízzel elkeverve, étkezés közben. A kezelés minimális időtartama 3-4 hét.

Figyelmeztetés

Alkoholelvonó kúra esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártj:

Galenika Dr. Hetterich GmbH, D-8510 Fürth/Bayern, Németország.

Forgalmazza

Fahrvitex Kft. (kizárólagos joggal) 1061 Budapest, Jókai tér 7. II/22.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-187/1990.

Prostatonin® Pharmaton kapszula

Összetétel

Csalángyökér kivonat és Pygeum kivonat.

Felhasználási javaslat

Kezdődő prostatamegnagyobbodás, gyakori vizeletürítési nehézségek okozta panaszok enyhítésére szolgál.

Alkalmazás

Naponta 2x1 kapszula bevétele ajánlott szétrágás nélkül, kevés folyadékkal, étkezés után. A kezelést legalább 8 hétig folytatni kell. Cukorbeteg is fogyaszthatják.

Figyelmeztetés:

Alkalmazása során ritkábban és nagyobb mennyiségű vizedet ürül, ami nyugodtabb éjszakai pihenést eredményez.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 30 vagy 100 kapszula.

Gyártja

Pharmaton SA Via Mulini, CH-6934 Lugano - Bioggo, Svájc.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-347/1992.

Pulminetta tableta inhalációra**Összetétel**

Perubalzsam, mentol, timol, kakukkfű, eukaliptusz és citromolaj, konyhasó.

Felhasználási javaslat

A készítmény megfázás, hurutos megbetegedés esetén, valamint preventív céllal alkalmazható. Egyrészt a szoba levegőjébe juttatva fejti ki kedvező hatását, másrészt inhalálás útján, amikor oldja a nyálkahártyára tapadt váladékot, és elősegíti annak felköhögését.

Alkalmazás

Felnőttek számára 1-2 tablettát, gyermekek esetében (3 év felett) 1 tablettát dobjunk egy nyitott edényben lévő, kb. 1 liter forró vízbe vagy kamillateába, és 10-15 percig lélegeztessük be a gózt a beteggel, a tál fölé hajolva. Az edényt és a beteg fejét úgy takarjuk be, hogy mintegy "sátorban" történjék a szer belélegzése. Az inhalálás naponta 2-3 alkalommal megismételhető.

Figyelmeztetés

Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! Szívgyengeség esetén tilos a fejet inhaláció közben törülközővel letakarni, illetve beborítani! A gyermekekre a leforrázás veszélye miatt fokozottan ügyeljünk! Hároméves korig a készítmény alkalmazása tilos!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 9 tableta.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-425/1993.

Pulminol-F légzéskönyítő krém felnőtteknek**Összetétel**

Eukaliptusz, borsosmenta, fenyő és kakukkfűolaj, valamint kámfor természetes (állati és növényi eredetű) zsiradék alapú krém.

Felhasználási javaslat

A Pulminol-F légzéskönyítő krém a különböző meghűléses betegségek, köhögés, nehézlégzés esetén kedvezően hat, megnyugtatja a beteget, csökkenti, illetve megszünteti a gyakran fellépő viszketést, kaparó érzést a torokban, illetve az orrban.

Alkalmazás

Alkalmazhatjuk bedörzsöléssel és inhalálás útján is. Bedörzsölés esetén kenjük 2-4 cm hosszúságú krémet a beteg mellkasára, és finom mozdulatokkal dörzsöljük szét. A kezelést szükség szerint 2-4 alkalommal ismétljük meg. Inhalálás esetén tegyünk néhány cm hosszú krémet egy nyitott edényben lévő kb. 1 liter, forrásban lévő vízbe vagy kamillateába és lélegeztessük be a beteggel a gózt 10-15 percen keresztül az edény fölé hajolva. Az inhalációt naponta 2-3 alkalommal ismétljük meg.

Figyelmeztetés

Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! Gyermekek 6 éves kor alatt nem használhatják a szert! Közvetlenül az orrba kenni tilos!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 20 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-426/1993.

Pulminoil-GY légzéskönyítő krém gyerekeknek**Összetétel**

Eukaliptusz, fenyő és kakukkfűolaj természetes (állati és növényi eredetű) zsiradék alapú krém.

Felhasználási javaslat

A Pulminoil-Gy légzéskönyítő krém, különböző meghűléses betegségek, köhögés, nehézlégzés esetén kedvezően hat, megnyugtatja a beteget, csökkenti, illetve megszünteti a gyakran fellépő viszketést, kaparó érzést a torokban, illetve az orrban.

Alkalmazás

Alkalmazható bedörzsöléssel és inhalálás útján is. Bedörzsölés esetén kenjünk 2-4 cm hosszúságú krémet a beteg mellkasára, és finom mozdulatokkal dörzsöljük szét. A kezelést szükség szerint 2-4 alkalommal ismétljük meg. Inhalálás esetén tegyünk néhány cm hosszú krémet nyitott edényben lévő, körülbelül 1 liter, forrásban lévő vízbe vagy kamillateába és 10-15 percen keresztül lélegeztessük be a beteggel a gőzt az edény fölé hajolva. Az inhalációt naponta 2-3 alkalommal ismétljük meg.

Figyelmeztetés

Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje hideg levegő belélegzését! A gyermekekre a leforrázás veszélye miatt fokozottan ügyeljünk! Közvetlenül az orrba kenni tilos!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 20 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-427/1993.

Raphachol granulátum

Összetétel

Feketeretek kivonat, édesköményolaj.

Felhasználási javaslat

A feketeteretek hatékony a különböző eredetű emésztési zavarok enyhítésében; a teltségérzet, puffadás megszüntetésében, az epekiválasztás fokozásában és gyorsításában. Növeli az epe túróképességét a nehezen emészthető élelmiszerekkel szemben. Magas vitamintartalma (B és C) jótékonyan egészíti ki terápiás hatását. Az édesköményolaj ismert és széles körben alkalmazott szélhajtó szer. Eredményesen növeli a feketeteretek fent említett hatásait, teljesen elfedi annak kissé kellemetlen ízét.

Adagolás

Szükség esetén naponta 1 csapott adagolókanálnyi granulátum bevétele javasolt, illetve kúraszerűen alkalmazva naponta legfeljebb 3x1 adagolókanálnyi a főétkezések után.

Figyelmeztetés

Epekőbetegség esetén a készítmény alkalmazása nem javasolt!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 70 g.

Gyártja és Forgalmazza

PARMA PATIKA Gyógyszerellátó Vállalat, 1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben, valamint a Pharma Discontban (1145 Budapest, Uzsoki utca 36/a).

Nyilvántartási szám: OGYI-090/1988.

Redusan kapszula és tablettá

Összetétel

Kapszula:

Guargumi granulátum, guargumipor, glukomannanrostok, xantángumi rostok.

Tabletta:

Kalcium foszfát, kálium foszfát, nátrium foszfát, cinkszulfát, krómtartalmú élesztő.

Felhasználási javaslat

A készítmény alkalmazásával csökkentett kalóriabevitel mellett, éhségérzet nélkül elérhető a testsúly csökkenése, emellett a fogyókúra által elért testsúly megtartására is szolgál.

Alkalmazás

Naponta 2x4 kapszula bevétele ajánlott szétrágás nélkül, étkezés előtt 15-30 perccel; és 2x3 tablettáé röviddel étkezés előtt vagy étkezés közben, bőséges (legalább 2 dl) folyadékkal.

Figyelmeztetés

A nyelőcső megbetegedései, rekeszsérv, mellékpajzsmirigy túlműködése, illetve veseelégtelenség esetén ellenjavallt! Májfunkciós zavarban szenvedők a kúra megkezdése előtt forduljanak a kezelőorvoshoz tanácsért!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 112 kapszula vagy 84 tablettá.

Gyártja

Multi Pharma Sweden AB, PO. Box 1021 S-43621 Askim, Svédország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-577/1995, OGYI-576/1995.

Reegin tabletta

Összetétel

Glutaminsav és aszparaginsav.

Felhasználási javaslat

Gyorsítja a szervezet szellemi és fizikai kifáradását követő regenerálódást, ezért az átmeneti vagy tartós fizikai igénybevétel során fellépő fáradtságérzet csökkentésére, illetve az ilyen esetben kialakuló koncentrációképesség csökkenés megelőzésére javasolják.

Alkalmazás

Átmeneti fizikai igénybevételkor reggel és délben 1-1 tabletta; tartós fizikai igénybevételkor reggel és délben 2-2 tabletta, este 1 tabletta, fokozott szellemi igénybevétel esetén reggel 1/2, délben 1 tabletta bevételre javasolt, mindig étkezés közben.

Figyelmeztetés

Alkalmazása során felszínes alvás előfordulhat! Vesebetegség esetén ellenjavallt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 20 tabletta.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-526/1995.

Resculini tinktúra

Összetétel

Galagonyatermés, hársfavirág, kocsány, vadgesztenyelevél és kivonata, cseresznye és meggytermés szűrős gyöngyajakfű alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A tinktúra az érlemeszesedés, valamint az érlemeszesedés okozta szív- és érrendszeri szövődmények megelőzésére és kezelésére alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 3x30 cseppet vízbe, teába vagy üdítőitalba cseppentve, étkezés után kell fogyasztani.

Figyelmeztetés

A Resculini tinktúra 40% alkoholt tartalmaz, ezért alkalmazása gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén nem javasolt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 50 ml.

Gyártja

Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-151/1990.

Revalid® kapszula

Összetétel

DL-metionin, L-ciszтин; kalcium pantotenát, B1-vitamin, B6-vitamin, para -amino benzoésav, köleskivonat, búzacsíra-kivonat, orvosi élesztő, nyomelemek (vas, cink, réz) komplex kötésben.

Felhasználási javaslat

Haj- és körömregeneráló. Megállítja a hajhullást, serkenti a haj újránövekedését, erősíti a körmöket, csökkenti a korpásodást, viszketést, seborrhoeát.

Alkalmazás

Általában napi 3 alkalommal 1 kapszula bevételre ajánlott 3 hónapon át, súlyosabb esetben 3 alkalommal 2 kapszula javasolt.

Figyelmeztetés

Szulfonamid egyidejű alkalmazása ellenjavallt! Napi 6 kapszulás adagolásnál esetenként enyhe emésztési zavar léphet fel.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 30 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-197/1991.

Rhamno-fitt® kapszula

Összetétel

Homoktövis olaj.

Felhasználási javaslat

A homoktövis-húsolajnak magas a béta karotin tartalma. Magas béta karotin, E vitamin és telítetlen zsírsav tartalmánál fogva jelentős szabad gyökfogó aktivitásának köszönhetően lassítja a szervezet öregedési folyamatát, fokozza a szervezet természetes ellenálló képességét. A készítmény ajánlott betegség utáni lábadozás időszakában, illetve alkalmas A-vitamin-hiány megelőzésére.

Alkalmazás

Ajánlott adagolása naponta 3x1 kapszula. Fénytől védve, hűvös helyen tároljuk. **Felhasználható:** 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 30 kapszula.

Gyártja és Forgalmazza

BIOGAL Gyógyszergyár Rt. Debrecen, Pallagi út 13.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-515/1995.

Rheudol forte reumakrém

Összetétel

Méhméregkivonat, árnikatinktúra, kámfor.

Felhasználási javaslat

A készítmény reumatikus és ízületi fájdalmak, porckorong elváltozások önálló kezelésére, vagy gyógyszeres és fizioterápiás kezelések kiegészítéseként alkalmazható, lágyrész reumatizmusok, traumás ízületi gyulladás és degeneratív reumás megbetegedések esetében.

Alkalmazás

Kenjük a Rheudol forte reumakrémet a fájdalmas testrésze, ízületre és annak környékére kb. 1 mm vastagságban, majd dörzsöljük a bőrbe. A fájdalom erősségétől függően a kezelést naponta több alkalommal ismételjük meg. Ha pakolásként alkalmazzuk a kezelendő testrészt 1-2 mm vastagon kenjük be, fedjük le műanyag fóliával, és vékony vászondarabbal kössük át. A pakolást legalább fél óráig hagyjuk a fájó testrészen, és közben néhányszor mozgassuk át a kezelt ízületet.

Figyelmeztetés

Használat előtt először kis bőrfelületen próbáljuk ki, mivel a méhméregkivonat ritkán allergiás bőrreakciót (tartós bőrpír, viszketés, duzzanat) válthat ki. Ha ilyen tünetek jelentkeznének, a kezelést be kell szüntetni! Nyílt sebre, hámsérült területre nem alkalmazható! Szembe ne kerüljön!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 50 g.

Gyártja

IN VITRO Kutató-Fejlesztő Kft. 2120 Dunakeszi, Fő út 101.

Forgalmazza

AZÚR Kereskedelmi Rt. 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-307/1992.

Ribeka oldat

Összetétel

Bíbor kasvirág és feketeribizli termésének alkoholos oldata.

Felhasználási javaslat

A feketeribizli és a bíbor kasvirág hatását egyesíti úgy, hogy megőrzi a nyers gyümölcsre és növényre jellemző hatóanyagtartalmat. Nagy mennyiségben található benne A, B, C, E- és P vitamin, valamint kálium, kalcium, nátrium, vas, réz, foszfor, mangán, nikotinsav, flavonoidok, antociánok. Hatóanyagai révén fokozza a legyengült szervezet védekezőképességét a fertőzésekkel szemben. Alkalmazható megfázásos állapotok, légúti fertőzések megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésére.

Alkalmazás

Akut fertőzés esetén az első nap 3x2 kávéskanálnyi, majd a második naptól 2x2 kávéskanálnyi oldat bevétele javasolt. A megelőzés céljából 2-3 alkalommal 1 kávéskanálnyi ajánlott.

Figyelmeztetés

Krónikus elhúzódó betegségek, valamint fészkesvirágzatú, növényekkel szemben fennálló érzékenység esetén ellenjavallt! Kúraszerű alkalmazása esetén a készítmény folyamatosan legfeljebb 8 hétig szedhető, majd a kúra folytatása előtt 2-3 hetes szünetet kell beiktatni! 20% alkoholt tartalmaz.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 200 ml.

Gyártja és Forgalmazza

PROBITAS Bt. 2890 Tata, Kálvária utca 98.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-463/1994.

Robofit cseppek

Összetétel

Leuzeagyökér, borsosmentalevél, szederlevél és csalánlevél alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A Robofit csepp stresszvédő hatású, növeli a szellemi és fizikai teljesítőképességet. Erősítő, étvágyjavító hatása miatt leromlott, túlterhelt szervezet, lábadozó betegek és idős emberek kezelésére is alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 3x30 csepp bevétel ajánlott étkezés előtt, kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés

A Robofit csepp 40% alkoholt tartalmaz, ezért gépjárművezetés és magasban történő munkavégzés esetén alkalmazása nem javasolt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

Gyógynövény Kutató Intézet Rt. 2011 Budakalász, József Attila utca 68.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-340/1992.

Rowachol® kapszula

Összetétel

Mentol, menton, pinén (alfa és béta), kamfén, cineol, borneol, olívaolaj.

Felhasználási javaslat

A készítmény máj és epebetegségek (pl. epekő, epegörcs, epehólyag és epevezeték gyulladása) megelőzésére, illetve kezelésére szolgál.

Alkalmazás

Felnőtteknek 3-4 alkalommal 1 kapszula bevétel ajánlott étkezés előtt fél órával. A kezelés során zsír és koleszterinszegény diétát tanácsos tartani. Túladagolás esetén gyomormosás és tüneti kezelés szükséges. Mentol és kámfor íz érzete kezdetben előfordulhat. Az előírt adagot nem szabad túllépni!

Figyelmeztetés

Terhesség és szoptatás ideje alatt, valamint gyermekek számára ellenjavallt! Mentolallergia esetén véralvadástlókkkal való együtt adása kerülendő.

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 30, 50 vagy 100 kapszula.

Gyártja

Rowa-Wagner GmbH, Frakfoster Str. 77, D-51427 Bergish Gladbach, Németország.

Forgalmazza

SATCO Trading Ltd. 1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-545/1995.

Rubin

Összetétel

Természetes hatóanyagok felhasználásával készült só, alkoholos oldattal fedve.

Felhasználási javaslat

A Rubin jól alkalmazható ízületi fájdalmaknál izomlazító, mozgást könnyítő hatása révén. Ízületi gyulladásoknál, enyhe gyulladáscsökkentő hatása miatt csillapítja a fájdalmat, a merev ízületek mozgását javítja, a gyógytorna hatékony kiegészítője. Mérsékli a reumás eredetű fájdalmakat, a krónikus hát és váll

fájdalmakat hatékonyan megszünteti, egyes esetekben a fejfájás is elmulasztható vagy enyhíthető a segítségével.

Alkalmazás

Egészítsük ki a flakon tartalmát a csavarmentet kezdetéig, kb. 150 ml desztillált vagy ivóvízzel. Rázogatás közben a sókristályok teljesen feloldódnak. Az így elkészített oldat 1 hónapig használható. A fájdalmas testrészt az oldattal naponta 3-4 alkalommal dörzsöljük be.

Figyelmeztetés

Csak külsőleg, ép bőrfelületen használható.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 200 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt. Szeged, Kenyérgyári út 5.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-268/1992.

Salonpas® air spray

Összetétel

Mentol, kámfor, metilszalicilát, ózonbarát hajtóanyag.

Felhasználási javaslat

Izomfájdalmak, hátfájás, gyulladás, zúzódás vagy rándulás okozta ízületi fájdalmak enyhítésére szolgál.

Alkalmazás

Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet, majd permetezzük rá a sprayt egyenletesen kb. 3 másodpercig. Naponta maximum ötször ismétljük meg a kezelést, legfeljebb 7 napon keresztül.

Figyelmeztetés

Csak felnőttek vagy 12 évnél idősebb gyermekek használják! Csak az előírás szerint, kizárólag külsőleg alkalmazható! Nagy koncentrációban való belégzése veszélyes. Vigyázzunk, hogy ne kerüljön a szembe, a nyálkahártyára, kiütésre, sérült bőrfelületre! Ne használjuk nyílt láng közelében, mert gyúlékony anyagot tartalmaz! Szalicilátérzékenység és allergiás panasz esetén a kezelőorvoshoz kell fordulni! Érzékeny bőrűek számára ellenjavallt!

Kiszerelési egység: 80 ml.

Felhasználható: 4 évig.

Gyártja

HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán.

Forgalmazza

VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-218/1991.

Salonpas®-E rugalmas gyógytapsz

Salonpas® fájdalomcsillapító tapsz

Összetétel

Metilszalicilát, mentol, kámfor, glikolszalicilát, tokoferol acetát, timol.

Felhasználási javaslat

Mindkét tapsz az izomfájdalmak, hátfájás, gyulladás, zúzódás, túleröltetés, ütés vagy rándulás okozta ízületi fájdalmak enyhítésére szolgál.

Alkalmazás

Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet. Távolítsuk el a tapsz hátoldalán lévő védőfilmet. Helyezzük azt a kezelendő felületre, és gyengéden simítsuk rá úgy, hogy bőrfelületre ragadjon. Naponta legalább háromszor cseréljük a tapszt; ügyelve arra, hogy egy tapsz 8 óránál tovább ne maradjon a bőrön.

Figyelmeztetés

Vigyáztunk, hogy ne kerüljön kiütésre, sérült bőrfelületre! Kezelés közben ne használjunk melegítőpárnát! Érzékeny bőrű felhasználó először egy kis tapszdarabbal végezzen kezelési próbát. Ragassza a karjára, hagyja rajta kb. 60 percig, és ha a tapsz eltávolítása után kiütést, viszketést vagy a bőrfelület piros elszíneződését tapasztalja, hagyja abba a kezelést. Szalicilátérzékenység esetén a tapsz használata ellenjavallt!

Felhasználható: 4 évig.

Kiszerelési egység: 20 db tapsz.

Gyártja

HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán.

Forgalmazza

VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-216/1991, OGYI-214/1991.

Salonpas® gél**Összetétel**

Metilszalicilát, mentol.

Felhasználási javaslat

Izomfájdalmak, hátfájás, zúzódás, túleröltetés, ütés vagy rándulás okozta ízületi fájdalmak enyhítésére szolgál.

Alkalmazás

Tisztítsuk és szárítsuk meg a kezelendő felületet. Nyomjunk egy kis mennyiségű zselét a fájdalmas területre, és jól dörzsöljük be. Naponta legfeljebb háromszor ismételjük meg a kezelést.

Figyelmeztetés

Kizárólag külsőleg használjuk! Vigyázzunk, hogy a kenőcs ne kerüljön szembe, nyálkahártyára, kiütésre, sérült bőrfelületre! Kezelés közben ne használjunk melegítőpárnát! Szalicilátérzékenység esetén használata ellenjavallt!

Felhasználható: 4 évig.

Kiszerelési egység: 40 g.

Gyártja:

HISAMITSU Pharmaceutical Company, Tosu, Saga, Japán.

Forgalmazza:

VEXIMP Kft. 1047 Budapest, Fóti út 56.

Kapható:

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-215/1991.

Salusan gyógykeserű (alkoholmentes)**Összetétel**

Golgotavirág, citromfűlevél, rozmaringlevél, macskagyökér, orbáncfű, komló termése, komlótej, búzacsíra, árpacsíra, narancshéj, zsurlófű, medveszőlőlevél, citromhéj, citromcirok, ízesítőanyagok.

Felhasználási javaslat

A készítményben lévő főbb hatóanyagoknak kedvező hatása van a keringésre. Jól alkalmazható öregkori és neurotikus eredetű keringési panaszok esetén. Kedvező hatású alvászavarok, feszült, szorongásos állapotok kezelésében. Megelőzés céljából ajánlott mindazoknak, akiknek idegrendszere és vérkeringése a hétköznapiak során nagy megterhelésnek van kitéve.

Alkalmazás

Naponta 2 alkalommal 20 ml folyadék bevétele ajánlott délben és este. Szükség esetén a napi adag 2x40 ml-re emelhető.

Figyelmeztetés

Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 250 ml.

Gyártja

SALUS-HAUS, Bahnhofstrasse 24, D-8206 Bruckmühl, Németország.

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-339/1992.

Salus vízhajtó kapszula**Összetétel**

Nyírfalevél, borókabogyó olaj.

Felhasználási javaslat

A nyírfalevélnek népgyógyászatilag igazolt vizelethajtó hatása van. A borókabogyó olaj a vizelethajtó hatáson kívül, fokozza az anyagcserét, a nitrogéntartalmú anyagcseretermékek ürítését és salaktalanít.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1 kapszula bevétele ajánlott étkezés előtt, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés

Kúraszerűen 1-2 doboz beszedése után a következő kúrát csak 3 hónap elteltével szabad elkezdni.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 45 kapszula.

Gyártja:

SALUS-HAUS, Bahnhofstrasse 24, D-8206 Bruckmühl, Németország.

Importálja

Sal-Bert Bt. 3304 Eger, József Attila utca 82.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-468/1994.

Sanhelios Börnolax hashajtó kapszula

Összetétel

Ricinusolaj.

Felhasználási javaslat

Különböző eredetű bélrenyheség esetén alkalmazható.

Alkalmazás

Általában egy alkalommal, este 10-15 kapszulát vagy több napon át esténként 6 kapszulát célszerű bevenni, kevés folyadékkal, szétrágás nélkül. Idült székrekedés esetén, több héten keresztül esténként 2-4 kapszula bevétel ajánlott.

Figyelmeztetés

Kúraszerű (3-4 hetes) alkalmazását időnként meg kell szakítani, vagy szükség esetén más típusú (sós) hashajtó alkalmazására kell áttérni. Bélcsvarodás, különféle epebántalmak, tisztázatlan eredetű hasi fájdalom, terhesség esetén és csecsemőknek ellenjavallt. Nagyobb adag bevétel fokozott folyadék és sóveszteséget, ritkán gyomorirritációt vagy allergiás bőrkiütéseket okozhat.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 60 kapszula.

Gyártja

Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-390/1993.

Sanhelios Johanniskrautöl kapszula

Összetétel

Orbánfűolaj.

Felhasználási javaslat

A népgyógyászatban régóta használt orbánfű olajos kivonatát tartalmazza. A készítmény, szorongást és félelemérzést csökkentő, depresszióellenes és gyulladáscsökkentő hatású. Pszichovegetatív zavarok, depressziós panaszok, félelem és nyugtalanság okozta alvászavarok, emésztési rendellenesség esetén alkalmazható.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 2 kapszula bevétel ajánlott, étkezés után, kúraszerűen (5-6 hónapig).

Figyelmeztetés

Gyomor és nyombélfekély esetén ellenjavallt. Alkalmazása során egyéni fényérzékenység léphet fel, különösen a világos bőrűeken.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 48 kapszula.

Gyártja

Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-293/1992.

Sanhelios Teufelskralle kapszula

Összetétel

Harpagophytum procumbens gyökerének kivonata.

Felhasználási javaslat

Hatóanyagai keserűanyagok, így fokozza a gyomor és bélnedvek kiválasztását, elősegíti az emésztést, enyhe vízajtó, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító. Ezért alkalmazható étvágytalanság, emésztési rendellenességek esetén, ezen kívül a máj, az epe, a vese működésének serkentésére és a salaktalanítás elősegítésére.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1 kapszula étkezés utáni bevétele ajánlott.

Figyelmeztetés

Gyomor és nyombélfekély, valamint epekőbetegség esetén ne alkalmazzuk!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 48 kapszula.

Gyártja

Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-364/1992.

Sanhelios 333 fokhagyma-fagyöngy-galagonya kapszula

Összetétel

Fokhagyma, fagyöngy, galagonya.

Felhasználási javaslat

A Sanhelios 333 kapszula az öregkori szívpanaszok és érrelmeszesedés megelőzésére, magas vérnyomás esetén a gyógyszeres terápia kiegészítésére szolgál, de alkalmazható kimerültség és fokozott ingerlékenység, illetve betegség utáni állapotjavítás esetén is.

Alkalmazás

Naponta 3 alkalommal 1-2 kapszula bevétele ajánlott étkezés előtt, szétrágás nélkül, kevés folyadékkal. Ajánlatos kúraszerűen szedni (5-6 csomagot).

Figyelmeztetés

Cukorbeteg is szedhetik.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 45 rágótabletta.

Gyártja

Börner GmbH, Moosrosenstrasse 7-13., D-1000 Berlin 47, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-442/1998.

Selactiv tablettá

Összetétel

Biológiai úton előállított szerves szelén, vitaminok (béta-karotin, E-vitamin), magas természetes B-vitamin komplex tartalmú speciális élesztő, feltárt inaktivált formában.

Felhasználási javaslat

A Selactiv tablettá természetes eredetű sejtvédő, antioxidáns anyagokat tartalmaz. Jól alkalmazható a sejteket károsító ún. szabadgyökök kedvezőtlen hatásaink mérséklésére, a szervezet ellenálló képességének fokozására, az öregedési folyamatok lassítására, a szív és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésére, kiegészítő kezelésére.

Alkalmazás

Javasolt adagolása felnőtteknek naponta 3x1 tablettá, gyermekeknek naponta 1-2 tablettá, étkezés közben vagy után. A készítmény alkalmazása során magas C-vitamin tartalmú táplálék fogyasztása ajánlott. Negyedévenként 1 hónapos kúra javasolt.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 90 tablettá (1 havi adag).

Gyártja és Forgalmazza

Arany Kapu Rt. 6413 Kunfehértó, Pf. 5.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-452/1994.

Selenor tablettá

Összetétel

Szelénnél dúsított élesztőpor.

Felhasználási javaslat

A szelén létfontosságú nyomelem, melynek beviteléről a szervezetbe állandóan gondoskodni kell. Bizonyított, hogy a magyarországi szelénhiány kóros szerepet játszhat a szív és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kialakulásában. A készítmény alkalmazható szív és érrendszeri betegségek megelőzésére, illetve mérséklésére, reumatikus bántalmak megelőzésére, a szervezetben lezajló gyulladási folyamatok csökkentésére. Lassítja a szervezet öregedését, védelmet nyújt a környezetszennyezés károsító hatásával szemben.

Alkalmazás

Szelénhiány pótlására napi 1 tablettát kúraszerű szedése javasolt.

Figyelmeztetés

Szélsőségesen magas adagban (napi 10 tablettát) mérgező lehet!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 40 tablettát.

Gyártja

B PHARMA Kutató és Fejlesztő Bt. 1025 Budapest, Zuhany utca 2/b

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-359/1992.

Stompax tablettát

Összetétel

Édeskömény, kömény, borsosmenta és kamillaolaj.

Felhasználási javaslat

Emésztési rendellenességgel összefüggő panaszok enyhítésére szolgál. A négy illóolaj keveréke az emésztőrendszerben a szekréció fokozásával javítja az emésztést, mérsékli a puffadtságot és a teltségérzetet, oldja a székrekedés okozta hasi szélgörcsöket.

Alkalmazás

Felnőtteknek minden étkezés után vagy szükség esetén 1-2 tablettát, gyermekeknek szükség esetén, étkezés után 1 tablettát bevétele ajánlott.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 30 tablettát.

Gyártja és Forgalmazza:

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-221/1991.

Szennavit hashajtóhatású lekvár

Összetétel

Bengekéreg és szennalevél vizes kivonatát tartalmazó szilvalekvár.

Felhasználási javaslat

Napjaink civilizációs betegségei közt szerepel a székrekedés is, amelynek oka rendszerint a belek rendellenes működése, mozgása. Enyhébb esetekben a panaszok az étrend megváltoztatásával enyhíthetők, komolyabb panaszok jelentkezésénél, gyógyhatású készítmények fogyasztása indokolt. A Szennavit hashajtó lekvár összetevői révén (gyógynövények és szilvalekvár) fokozza a renyhe bélmozgást, a vastagbél víz-tartalma megnő, a széklet fellazul, könnyen üríthetővé válik. A győglekvár egészséges, érett gyümölcsből és a gyógynövények keverékéből előállított koncentrátumból készül.

Alkalmazás

A magas rosttartalmú, kellemes ízű készítményből 3-6 éves korban naponta 1 mokkáskanálnyi, 6-12 éves korban naponta 1 kávéskanálnyi, 12 éves kor felett és felnőtteknek naponta 1-2 kávéskanálnyi lekvár elfogyasztása ajánlott este, étkezés után.

Figyelmeztetés

Terhes és szoptató anyák, továbbá a 3 éves életkort még el nem ért gyermekek számára ellenjavallt!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 370 ml.

Gyártja és Forgalmazza

Szondi Fruit Kft. 2646 Drégelypalánk, Fő utca. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-024/1987.

Szélhajtó teakeverék**Összetétel**

Kamillavirág, fehérmályva-levél, borsosmentalevél, édesköménytermés, ánizstermés, koriandertermés.

Felhasználási javaslat

A teakeverék görcsoldó, emésztést elősegítő és gyulladáscsökkentő hatású. Serkenti az emésztőnedvek termelését, javítja az emésztési folyamatot. Gátolja a bélgázok képződését, a puffadást, és oldja az enyhe gyomor-bélrendszeri görcsöket.

Alkalmazás

Öntsünk le egy csészényi (2 dl) forró vízzel 1 csapott evőkanálnyi teakeveréket, és időnként kevergetve hagyjuk állni fél óráig. Szűrjük le. Tetszés szerint édesítve, naponta 1-2 alkalommal fogyaszthatunk 1-1 csészével az így elkészített teából.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 100 g.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 6.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-044/1988.

Dr. Theiss echinacea csepp**Összetétel**

Kasvirág őstinktúra alkoholos oldata.

Felhasználási javaslat

A készítmény fertőzőes megbetegedések megelőzésére, a már kialakult fertőzések lefolyásának gyorsítására, a tünetek enyhítésére, a szervezet ellenálló képességének növelésére alkalmazható. Fokozza az immunrendszer aktivitását. Előnyös minden olyan akut és krónikus megbetegedésben, amikor a szervezet ellenálló képessége időlegesen vagy tartósan csökken.

Alkalmazás

Szokásos adagja az ellenálló képesség fokozása céljából, megelőzésre, naponta 3x20-30 csepp. Akut fertőzésveszély esetén először 50 cseppet, majd 2 napig óránként 10-20 cseppet kell adagolni. Az alkoholos oldat a szájnyalvakról gyorsan felszívódik, ezért rövid ideig tartsuk a szájban.

Figyelmeztetés

50% alkoholt tartalmaz! Terhesség és szoptatás idején, valamint alkoholbetegségben szenvedőknek nem ajánlott!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 50 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-264/1991.

Dr. Theiss eukaliptusz meghülés elleni balzsam "S"**Összetétel**

Eukaliptusz és erdeifenyő olaj, kámfor és szilárd zsír.

Felhasználási javaslat

A készítmény kiváló hatású kiegészítő szer a légutak meghűléses, illetve fertőzőes eredetű hurutos megbetegedéseinek kezelésében. Enyhíti a köhögési ingert, csökkenti a váladékképződést, elfolyósítja a letapadt váladékot, elősegíti a nyák kiürülését. Mentolt nem tartalmaz, így kisgyermek kezelésére is alkalmas!

Alkalmazás

Naponta többször, különösen éjszakára kenjük be a balzsammal a mellkas és a hát bőrét, és tartsuk melegen. Inhaláláshoz 1/2-1 liter forró, de nem forrásban lévő vízbe tegyünk 2 kávékanálnyi balzsamot.

Figyelmeztetés

A gyerekeknél alkalmazott inhalálás közben fokozottan figyelni kell a forrázásveszélyre!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 50 g.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-277/1992.

Dr. Theiss hashajtó tea (instant)

Összetétel

Szennalévléből és szennatermésből készült szárított kivonat, köményolaj és ánizsolaj.

Felhasználási javaslat

Bélrenyheség következtében kialakult székrekedés esetén és minden olyan esetben alkalmazható, amikor különösen fontos, hogy a széklet laza, könnyen üríthető legyen (aranyér, hasi műtétek utáni állapotok, röntgen kontrasztanyag ürítése). A kömény és ánizsolaj csökkenti a puffadásos panaszokat, és megnyugtatja a bélnyálkahártyát.

Alkalmazás

Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani.

Figyelmeztetés

Alkalmazása a bélelzáródás minden formájában ellenjavallt! Terhesség és szoptatás alatt csak az orvossal történt előzetes megbeszélés esetén fogyasztható. Hosszú ideig fogyasztva, illetve az adagolási utasítás be nem tartása esetén kialakulhatnak nem kívánatos hatások (elektrolit veszteség (kálium), fehérjevizelés, vér-vizelés, bélnyálkahártya pigmentáció). A hosszan tartó, rendszeres, illetve nem előírászerű alkalmazás esetén fellépő káliumvesztés felérősíti a párhuzamosan szedett szívre ható glikozidok hatását. Ennek a lehetősége miatt szívgyógyszert szedők csak az orvossal történt előzetes konzultáció után fogyaszthatják!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 125 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-368/1993.

Dr. Theiss hólyag és vesetea (instant)

Összetétel

Szárított medveszőlőlevél, indiai vesetealevél, nyírfalevél kivonat, borsosmentaolaj.

Felhasználási javaslat

A medveszőlő és a nyírfalevél ősi, kipróbált gyógynövények az enyhébb húgyhólyag és húgyúti fertőzések kezelésére. Az indiai vesetealevléből készült tea vízhajtó, de nem irritálja a vesét. A borsosmentaolaj ízjavító céllal került a készítménybe. A vese, a vesemedence és a húgyhólyag bakteriális és gyulladással megbetegedéseiben a teát nagy mennyiségben kell fogyasztani, hogy az "átmosó" hatás érvényesüljön.

Alkalmazás

Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani. Szokásos adagja óránként, kétóránként egy csésze. A hatáshoz szükséges, hogy a vizelet lúgos kémhatású legyen, ez nagy mennyiségű növényi táplálék fogyasztásával biztosítható.

Figyelmeztetés

Vese és keringési eredetű ödéma esetén nem fogyasztható! Alkalmazását az orvossal meg kell beszélni! Hosszan tartó alkalmazása nem ajánlott! Cukormentes, ezért cukorbeteg is fogyaszthatják. Érzékeny gyomrú felnőtteknél és gyermekeknél hányinger, hányás előfordulhat.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 125 ml, 250 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-367/1993.

Dr. Theiss kakukkfűves meghülés elleni fürdő "S"

Összetétel

Kakukkfűolaj, timol, rozsmaring, zsálya és körömvirág kivonat.

Felhasználási javaslat

A készítmény lázzal nem járó meghűléses megbetegedések, valamint akut és krónikus légúti elváltozások esetén elősegíti a gyógyulási folyamatot. A hatóanyagok köptető, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és hörgőgörcsoldó hatásúak.

Alkalmazás

100 g fürdőadalék 5 alkalomra elegendő. A címkén vonallal jelzett mennyiségű adagot egy fürdőkádnyi testhőmérsékletű vízhez adva naponta egyszer 15 perces fürdőt veszünk.

Figyelmeztetés

Lázás állapot, tbc, szív és keringési elégtelenség, magas vérnyomás, vénásrendszeri panaszok esetén nem alkalmazható!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 100 g.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-316/1992.

Dr. Theiss köptető és köhögéscsillapító tea (instant)**Összetétel**

Martilapulevéből, útifűből és kakukkfűből készült vizes kivonat, valamint ánizs- és édesköményolaj.

Felhasználási javaslat

A készítmény a bronchitis (hörghurut) és köhögés kezelésében évszázadok óta alkalmazott gyógynövények kombináció. A martilapulevél és az útifű egyéb hatóanyagai mellett nyáktartalmúak, ami csillapítja a légúti nyálkahártya irritációját, s ezen keresztül a köhögési ingeret. A kakukkfű csökkenti a hörgők görcsét, és elősegíti a köpet kiürítését. Antibakteriális hatását az ánizs és édesköményolajok hatása kiegészíti és felerősíti.

Alkalmazás

Szokásos adagja a nap folyamán egyenletesen elosztva 6 csésze tea, amelyből egy csészényit 1 kávéskanálnyi instant tea kb. 2 dl vízben való feloldásával készíthetünk el.

Figyelmeztetés

Terhesség és szoptatás alatt nem fogyasztható!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 100 ml, 125 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-374/1993.

Dr. Theiss körömvirág kenőcs**Összetétel**

Körömvirág kivonat sertészsíros kenőcsben.

Felhasználási javaslat

A körömvirág kivonatot tartalmazó kenőcs gyulladáscsökkentő, antibakteriális, szövetsarjadzást serkentő hatásai alapján kiválóan alkalmas rosszul gyógyuló sebek, műtéti hegek, hosszan tartó ágyhozakötöttség során kialakuló felfekvések, égési sérülések, visszeres panaszok, érgyulladás és aranyér kezelésére.

Alkalmazás

A kezelendő bőrfelületet naponta többször kenjük be a készítménnyel. Szükség esetén fedjük be mullpólyával.

Figyelmeztetés

Csak nem vérző, bőrrel részben fedett sebekre alkalmazható! Amennyiben allergiás tünetek nem jelentkeznek, svédceppes borogatással kombinálható a kezelés.

Felhasználható: 2 évig, felbontás után hűtőszekrényben tartandó!

Kiszerezési egység: 25 g, 50 g, 100 g.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-279/1992.

Dr. Theiss lándzsás utifű köhögés elleni szirup**Összetétel**

Lándzsásútifű kivonat, kálium szorbát, borsosmentaolaj, cukorrépaszirup és méz.

Felhasználási javaslat

Akut és krónikus hörghurut esetén egyaránt alkalmazható. Köhögéscsillapító és köptető hatású, kiválóan alkalmas a köhögési inger csillapítására is. Csökkenti a légúti irritációt, gyulladásgátló és antibakteriális hatású. A letapadt nyákot elfolyósítja, megkönnyíti a felköhögését.

Alkalmazás

Szokásos adagja felnőtteknek 2-3 óránként egy evőkanálnyi, gyermekeknek egy kávéskanálnyi, csecsemőknek 1/2 kávéskanálnyi szirup, amely jó ízű, hígítás nélkül is fogyasztható.

Felhasználható: 3 évig

Kiszerelési egység: 100 ml, 250 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-272/1992.

Dr. Theiss máj és epetea (instant)**Összetétel**

Gyermekláncfűgyökérből és herbából, valamint vérehulló fecskefűből készült vizes kivonat, kurkumagyökér kivonat, valamint borsosmentaolaj.

Felhasználási javaslat

A máj, az epehólyag és az epevezeték gyulladással megbetegedéseiben, valamint epeköves panaszok esetén alkalmazható. Valamennyi összetevő növény fokozza az epetermelődést és ürítést. A tea fogyasztásával a meglévő epekövek által okozott panaszok csökkennek. Az újabb kövek képződését is gátolja.

Alkalmazás

Egy csésze tea elkészítéséhez 1 kávéskanálnyi instant teát kell kb. 2 dl vízben feloldani. Szokásos adagja naponta 3x1 csésze. Szükség esetén a napi mennyiség esetleg 6 csészéig emelhető. Cukormentes, ezért cukorbeteg is fogyaszthatja.

Figyelmeztetés

Bél és epevezeték elzáródás esetén alkalmazása ellenjavallt! Mint minden keserűanyag-tartalmú készítmény fogyasztása során, mellékhatásként gyomorsavtúltengés léphet fel. A gyermekláncfű-tartalom miatt számolni kell a kiválasztott vizelet mennyiségének enyhe fokozódásával.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 125 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-373/1993.

Dr. Theiss svédcsepp**Összetétel**

Aloe, rebarbaragyökértörzs, theriák, mirha, citvoryökér, nagyzerjófű gyökér, enciángyökér, angyalgyökér, kámfor, vérontófű gyökértörzs, bábakalácsgyökér, hódpezsma, vörösfenyőtapló, szerecsendió virág, szennalevél, kálmosgyökértörzs, szerecsendiómag és sáfrány alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

Belsőleg:

Epe és gyomorpanaszok, bélrenyheség, emésztési zavarok esetén alkalmazható.

Külsőleg:

Gyulladások, reumatikus panaszok, rovarcsípések esetén használható.

Alkalmazás

Belsőleg:

Naponta 3-4 alkalommal 1 kávéskanálnyi svédcsepp bevétele ajánlott 1-1 csésze teában.

Külsőleg:

Alkalmazása a fájdalmas testrésze közvetlenül felkenve történhet, vagy borogatásként, amikor is a körömvirág balzsammal, illetve zsíros kenőccsel előzetesen bekent testrésze svédceppel benedvesített vattát helyezünk, majd műanyag fóliával befedjük, és melegen tartjuk.

Figyelmeztetés

40% alkoholt tartalmaz. Hasmenés, bélelzáródás, májműködési zavarok, terhesség esetén, alkoholelvonó kúra idején, 14 éven aluliak és szoptatós anyák részére ellenjavallt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-276/1992.

Dr. Theiss svédkeserű kapszula

Összetétel

Svédkeserű kivonat, szója-, pálma- és kókuszolaj, lecitin.

Felhasználási javaslat

Mai táplálkozásunk szegény keserűanyagokban, pedig a keserűanyagok pótolhatatlanok a jó emésztés számára. A Dr. Theiss féle svédkeserű kapszula pótolja ezt a hiányt, mert koncentráltan tartalmazza a keserűanyagokat. A kapszulák alkalmazása egyszerű, különösen utazásnál kényelmes a használatuk. Nincs keserű ízük, mert csak a gyomorban oldódnak. Elősegítik a jó emésztést, ezzel jó közérzetet biztosítanak. Nem tartalmaz alkoholt, mesterséges színező és ízesítőanyagokat, illetve tartósítószeret.

Alkalmazás

Főétkezés előtt 1-2 kapszula bevétele javasolt, kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés:

Terhesség és szoptatás ideje alatt fogyasztása nem ajánlott! Hasmenés és bélelzáródás esetén ellenjavallt!

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerezési egység: 30 kapszula.

Gyártja

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-240/1991.

Dr. Theiss zsályás öblögető

Összetétel

Zsályá és kamilla vizes alkoholos oldata.

Felhasználási javaslat

Gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatása folytán a mandulák, a torok, a szájüregi nyálkahártya, és a fogínygyulladásos folyamataiban fejt ki gyors, helyi hatást.

Alkalmazása

1-2 kupak készítményt öntsünk egy pohár langyos vízbe, s ilyen oldattal öblögessünk napjában többször.

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerezési egység: 50 g.

Gyártja:

NATURWAREN OHG, Dr. Peter Theiss, D-66424 Hamburg/Saar, Németország.

Forgalmazza:

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8.

Kapható:

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-315/1992.

Tigris balzsam (fehér)

Tigris balzsam (vörös)

Összetétel

Kámfor, mentol, szegfűszegolaj, japán mentaolaj, kajeput-olaj.

Felhasználási javaslat

Mindkét készítmény egyaránt alkalmazható a megfázásos tünetekre és reumás panaszokra. Összetevőinek mennyiségi eltérése miatt a Fehér Tigris Balzsamot elsősorban a nátha, torokfájás, köhögés és a hörghurut enyhítésére alkalmazható. A Vörös Tigris Balzsamot az izom és ízületi fájdalmak (ízületi gyulladás, idegyulladás, isiász, lumbágó, porckorong és keresztcsonti fájdalmak, izomfeszülések, nyakmerevség enyhítésére), sportsérülések (ficam, rándulás, húzódás) esetén sportmasszázsra, illetve vizkető rovarcsípésre javasolt.

Alkalmazás

Kenjük a balzsamot vékonyan a kezelni kívánt bőrfelületre és naponta 1-2, maximum 2-4 alkalommal legalább 5 percen keresztül masszírozzuk be a bőrbe.

Figyelmeztetés

Valamely alkotórésszel szembeni túlérzékenység esetén ellenjavallt! Csecsemőkorban és kisgyermekkorban nem alkalmazható!

Felhasználható: 5 évig.

Kiszerelési egység: 19,4 g.

Gyártja

Drug Houses of Australia (Asia) Pte. Ltd.

Forgalmazza

NATURPRODUKT Kft. 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 8

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-560/1995, OGYI-561/1995.

Tripinol rheuma ellen

Összetétel

Fenyőtúolaj

Felhasználási javaslat

A fenyőtúolaj fokozza a bőrben a vérátáramlást. Fürdőadalékként naponta használható krónikus reumás betegségek kiegészítő kezelésére. Mozgásszervi megbetegedésekben fájdalomcsökkentő, lábadozás, kimerültség idején élénkítő hatású. A légutak akut és krónikus megbetegedéseiben a terápia kiegészítésére alkalmazható.

Alkalmazás

Adagoljunk 10 ml (fájdalom esetén 20 ml) készítményt a fürdővízhez. 15-20 perces fürdőt vegyünk hetente 3 alkalommal. Fürdés után rövid ágynyugalom javasolt.

Figyelmeztetés

Terpentinolajjal szembeni túlérzékenység, nagyobb kiterjedésű bőrsérülések, ismeretlen eredetű akut bőrbetegségek, súlyos, lázas állapottal járó és fertőző betegségek, szívelégtelenség és magas vérnyomás esetén csak előzetes orvosi javallat alapján alkalmazható! Túlérzékeny egyéneken fokozott bőrreakciót válthat ki. Az egyidejű szappanozás, zuhanyozás és ledörzsölés a hatást csökkenti.

Felhasználható: 2 évig.

Kiszerelési egység: 40 ml, 100 ml.

Gyártja

ESPARMA Pharmazeutische Fabrik GmbH, Lutherstrasse 1-2., D-3014 Magdeburg, Németország.

Forgalmazza

VOLMIX Magyar-Osztrák Vegyes Vállalat, 1146 Budapest, Thököly út 76.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-386/1993.

Tussi-stop zselé gyermekeknek

Összetétel

Útifű és kakukkfűkivonatot, akácmézet, C-vitamint tartalmazó ánizs, ízesítésű zselé.

Felhasználási javaslat

Gyermekkorban igen gyakoriak az enyhébb felső légúti megbetegedések. A Tussi-Stop köhögéscsillapító, köptető hatása révén alkalmazható a megfázásos, felső légúti betegségek, így a torok és mandulagyulladás, a légcsőhurut, a hörghurut és a száraz köhögés kezelésére.

Alkalmazás

Naponta 3x1 mokkaáskanálnyi zselé bevétele ajánlott étkezés után.

Figyelmeztetés

Cukorbeteg nem fogyaszthatják! A készítmény 5% alkoholt tartalmaz!

Felhasználható: 1 évig, a felbontástól számítva 1 hónapig.

Kiszerelési egység: 5 g.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAFONTANA Rt. 1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-262/1991.

Uroherb tinktúra**Összetétel**

Csalángyökér, orvosiszálya-level, medveszőlőlevel, héj nélküli tökmag, nyírfalevél, fűzfakéreg, cickafarkfű és csalánlevel alkoholos kivonata.

Felhasználási javaslat

A tinktúra a népgyógyászatban gyakran alkalmazott, ismert gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó, vizeletkiválasztást elősegítő gyógynövények alkoholos kivonata. A prosztatatabántalmakból (prosztatamegnagyobbodás, prosztatagyulladás) eredő tünetek mérséklésére, prosztataműtétek elő és utókezelésekor a gyógyszeres terápia kiegészítésére szolgál.

Alkalmazás

Felnőtteknek naponta 3 alkalommal 1 evőkanálnyi tinktúra bevétel ajánlott. A kívánt hatás eléréséhez a fogyasztása kúraszerűen javasolt a kellemetlen tünetek megszűnéséig, de legalább 6 hétig.

Figyelmeztetés

20% alkoholt tartalmaz!

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerezési egység: 190 ml.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-282/1992.

Urtirex tableta**Összetétel**

Porított csalánlevel.

Felhasználási javaslat

Anyagesere fokozó hatása révén alkalmas a "tavaszi fáradtság" leküzdésére, a rossz közérzet javítására. Serkenti a veseműködést, ezáltal enyhe vízhajtó hatású. Alkalmazható reumás megbetegedések és köszvény esetén, a gyógyszeres kezelés kiegészítésére.

Alkalmazás

Enyhe vízhajtóként naponta 3x3 tableta bevétel javasolt étkezés előtt. Kúraszerű használatra, naponta 3-4 alkalommal 1 tableta bevétel ajánlott étkezés előtt.

Figyelmeztetés

Szív, illetve veseelégtelenség okozta ödéma esetén ellenjavallt! Mellékhatásként bőrkiütés előfordulhat.

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerezési egység: 30 tableta.

Gyártja és Forgalmazza

PHARMAREX Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. 1021 Budapest, Ötvös János utca 1-3.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-235/1991.

Uzara draszté**Összetétel**

Uzaryökér száraz kivonata és segédanyagok.

Felhasználási javaslat

Hatóanyagai csökkentik a bél sima izomzatában kialakult túl erős összehúzódásokat, vagyis bélgörcsök esetén oldják a görcsös fájdalmakat és csökkentik a belek fokozott működéséből adódó túlzott mennyiségű széklet és folyadékürítést, a hasmenés enyhül.

Alkalmazás

Felnőttek számára a kezelés első napján egyszerre 5 draszté, majd a panaszok megszűnéséig naponta 3-6 alkalommal 1 draszté bevétel ajánlott, kevés folyadékkal. Iskolás gyermekek számára a kezelés kezdetén 1 vagy 2 draszté, majd a panaszok megszűnéséig 3-6 alkalommal 1 draszté bevétel javasolt kevés folyadékkal.

Figyelmeztetés

1 és 6 éves kor között naponta 1-2 draszténál, felnőtteknek naponta 6 draszténál többet nem szabad bevenni! 4 napnál hosszabb ideig tartó hasmenés, illetve súlyos hasi görcsök esetén orvoshoz kell fordulni a panaszok okának tisztázása érdekében. Mivel a készítmény szívre kifejtett (szivglikozidszerű) hatással is rendelkezik, szívbetegségben szenvedők csak a kezelőorvossal történő megbeszélés és annak kifejezett engedélye mellett szedhetik a készítményt!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 30 draszté.

Gyártja

Stada Arzneimittel AG. Bad Vilbel, Németország.

Forgalmazza

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. 1061 Budapest, Király utca 12.

Kapható

Gyógyszertárakban.

Nyilvántartási szám: OGYI-499/1995.

Vapour Rub Mentholatum balzsam

Összetétel

Mentol, kámfor, metilszalicilát, eukaliptusz és fenyőtűolaj vazelines kenőcsben.

Felhasználási javaslat

Megfázás, láz esetén a mellkas, a hát és a nyak bőrére kenve vagy inhalálásra alkalmazva (1 kávéskanálnyit forró vízben felolvasztva) légzéskönnyítő hatású. Izomfájdalmak, görcsök, reumatikus fájdalmak, isiász és lumbágó esetén vékonyan az érintett bőrfelületre kenve a fájdalmat enyhíti. Hűsítő hatása miatt csillapítja a rovarcsípés, méhfullánk, csaláncsípés és a repedezett bőrfelület okozta viszketést.

Figyelmeztetés

Ügyeljünk rá, hogy szembe, nyálkahártyára, sérült bőrfelületre ne kerüljön! Mentolérzékenyek, csecsemők és 5 év alatti gyermekek ne használják!

Felhasználható: 3 évig.

Kiszerelési egység: 30 g.

Gyártja

MENTHOLATUM Co. Ltd. Longfield Road, Twyford, Berkshire, RG 10 9AT, NagyBritannia.

Forgalmazza

MEDIMPEX Kereskedelmi Rt. 1134 Budapest, Lehel út 11.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-313/1992.

Varikopax "B"

Varikopax Arikopax Szuper visszérkrém

Összetétel

Alumíniumsó víztartalmú kenőcsben.

Felhasználási javaslat

Visszérgyulladás esetén csökkenti a bőrhőmérsékletet és a bőrpírt, enyhíti a visszér okozta fájdalmakat. Tartós használata esetén a visszerek részben vagy teljesen visszahúzódnak eredeti helyükre. Enyhíti a terheléskor jelentkező fáradékonyságot, az ödémák okozta tompa nyomást és feszítő érzést. Élénkíti és megkönnyíti a visszeres végtag mozgását. Többszöri bekenés és enyhe masszírozás eredményeképpen csökken a bőrpír és a bőrhőmérséklet. A lobosodás megszűnik.

Alkalmazás

A kezelendő bőrfelületet alaposan tisztítsuk meg. A Varikopax visszérkrémet enyhe masszírozással dörzsöljük a bőrbe, a felszívódás segítése érdekében folyamatosan nedvesített (vizezett) kézzel. A kezelést naponta 3-5 alkalommal végezzük el.

Felhasználható

Varikopax "B": 2 évig.

Varikopax Szuper: 1 évig.

Kiszerelési egység

Varikopax "B": 95 g.

Varikopax Szuper: 50 g.

Gyártja és Forgalmazza

FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Rt. 6725 Szeged, Kenyérgyári út 5.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-139/1989, OGYI-174/1990.

Vitamass kenőcs

Összetétel

Ligetszépeolaj, lenolaj, napraforgóolaj, szezámogolaj, zsálya és kamilla illóolaja, valamint rozsmaringlevél, cickafarkfülevél, levendulavirág és kakukkfű kivonata.

Felhasználási javaslat

Ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló készítmény.

Alkalmazás

Vigyük fel a krémet a fájdalmas területekre, és könnyed mozdulatokkal masszírozzuk be.

Figyelmeztetés

Csak külsőleg alkalmazandó!

Felhasználható: 1 évig.

Kiszerelési egység: 70 cm³.

Gyártja

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 4060 Balmazújváros, Nádudvari út 56.

Forgalmazza

HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. 1051 Budapest, Arany János utca 29.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-239/1991.

Vulnosil kenőcs**Összetétel**

Kámfor, mentol, kakukkfűolaj, csukamájolaj zsíros kenőcsben.

Felhasználási javaslat

Alapvetően az I. és II. fokú égési sérülések kezelésére alkalmas gyógyhatású készítmény, de kedvezően használható hámsérülések, hámphányok, felfekvések (decubitusok) kezelésére is. Váladékozó, sebészetileg ellátott sebeknél csökkenti, illetve megakadályozza a kötszer sebbe tápadását, így a kötőcsere fájdalommentes. Természetes eredetű összetevői révén hűsítő, fájdalomcsökkentő, hámosító, sebgyógyulást gyorsító, bakteriostatikus-baktericid hatású. Impregnált kötszerek készítéséhez is ajánlott.

Alkalmazás

Enyhébb I. illetve II. fokú égési sérülések esetén kenjük a kenőcsöt vékony rétegben a sérült felületre. Steril gézlappal lefedhetjük. A kötést szükség szerint cseréljük.

Figyelmeztetés

Valamely hatóanyag iránti túlérzékenység esetén ellenjavallt! Különösen érzékeny pácienseknél egyes esetekben mellékhatásként túlérzékenységi reakciók léphetnek fel.

Felhasználható: 18 hónapig.

Kiszerelési egység: 65 g.

Gyártja és Forgalmazza

MediLine Kereskedőház, 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 2/b.

Kapható

Gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és viszonteladóknak a Herbaház Gyógytermék Nagykereskedésben, 1077 Budapest, Rózsa utca 47.

Nyilvántartási szám: OGYI-443/1993.

Woodward's gripewater hascsikarás elleni folyadék gyermekeknek**Összetétel**

Kapormagolaj, nátrium-bikarbonát.

Felhasználási javaslat

A készítmény hascsikarás ellen, illetve a szélbántalmak enyhítésére szolgál gyermekek számára.

Alkalmazás

1 hónapos kortól adható, naponta maximum 6 alkalommal, 1 teáskanálnyi (5 ml).

Figyelmeztetés

Egy hónapos kor előtt a készítmény nem alkalmazható!

Felhasználható: 2 évig, a felbontás után 2 hónapig.

Kiszerelési egység: 150 ml.

Gyártja

Woodward's Ltd. E 48 QA London.

Forgalmazza

Kombinátor Kft. Kecskemét, Mathiász János utca 16.

Kapható

Gyógyszertárakban és gyógynövényszaküzletekben.

Nyilvántartási szám: OGYI-382/1993.

